

ALEXIN®

MODO DE USO

Agitar vigorosamente a embalagem do produto, antes de usá-lo, realizando uma mistura de forma homogênea. O uso do produto é exclusivo como fertilizante.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em sua embalagem original, em lugares frescos e secos mantendo-o fora do alcance de crianças e animais. Proteger de possíveis geadas.

PRECAUÇÕES

Evitar as aplicações em condições climáticas extremas (condições de seca, elevada umidade relativa do ar, geada ou chuva). Lave todos os equipamentos de aplicação antes e depois de seu uso.

NOTA

Seguir as instruções do rótulo ou os dados do fabricante. Antes da aplicação deste produto, consulte um agrônomo qualificado ou um assessor agrícola sobre a utilização do mesmo. Aplicações fora destas recomendações são sempre feitas sob a responsabilidade do cliente. Este produto está sujeito às condições de venda da empresa, que estão disponíveis para os clientes.

Fabricado por:

Nulandis	Aeci Latam Produtos Químicos Ltda
14 Field Road (cnr Bird Street), Lilanton , 1459 South Africa info@nulandis.com TELEPHONE: +27 11 823800 FAX: +27 11 8261727	Av. das Americas, 8445, sala 409- Barra da Tijuca-RJ CEP 22.793-081 Telefone: 21-24311361 CNPJ: 18920.914/0001-36 EI – RJ-78948-8

Importado por:

AECI LATAM

FERTILIZANTE MINERAL MISTO

Fertilizante para aplicação via Foliar

Alexin®

Produto registrado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e do
Abastecimento sob o Nº RJ 78948 10000-8
Natureza Física do Produto: Fluido (suspensão homogênea)
Antes de utilizar este produto, leia atentamente o rótulo.
Após o uso, não reutilizar a embalagem.

GARANTIAS	p/p	p/v
Potássio (K2O) Solúvel em água	5,0%	62,0 g/L
Cálcio (Ca) Solúvel em água	2,6%	32,24 g/L
Magnésio (Mg) Solúvel em água	0,8%	9,92 g/L
Boro (B) Solúvel em água	0,2%	2,48 g/L

DENSIDADE..... 1,24 g/cm³

Contem 25% de agente complexante e Acido Salicílico

Alexin® é uma marca registrada da AECI Limited

Nº do Lote:

Data de Fabricação:

Data de Vencimento:

Prazo de Validade: Dois anos

Agite antes de usar

CONTEÚDO: 1 L

Produto Importado

ALEXIN®

RECOMENDAÇÕES DE USO:

AVISO: O produto não pode ser aplicado junto com nenhum produto a base de sulfatos ou fosfitos.

CULTURA	DILUIÇÃO EM 100 L H ₂ O	DOS- AGENS	OBSERVAÇÕES
MAÇÃS	200-300 mℓ	Máximo de 3 L / ha	Aplicar 3 a 4 pulverizações quando a floração está a 50% e repetir em intervalos de 21 dias.
PERAS	200-300 mℓ	Máximo de 3 L / ha	Aplicar 3 a 4 pulverizações quando a floração está a 50% e repetir em intervalos de 21 dias. Para utilização em Peras não misturar Alexin com outros adjuvantes ou alimentação foliar.
CITROS	200-300 mℓ	Máximo de 3 L / ha	Aplicar 3 a 4 pulverizações a partir da queda total das flores e repetir em intervalos de 28 dias.
CUCURBITACEA S (ABÓBORAS, MELÂNCIAS, MELÕES E PEPINOS)	500 mℓ	Máximo de 4 L / ha	Aplicar na época da floração e repetir em intervalos de 21 dias.
ALFACE, COUVE -FLOR, COUVE, COUVE CHINESA	500 mℓ	Máximo de 3 L / ha	Iniciar as pulverizações antes da formação da cabeça e repetir em intervalos de 14 a 21 dias.
PESSEGO, NECTARINAS, AMEIXAS, DAMASCOS AMÊNDOAS, AZEITONAS	200-300 mℓ	Máximo de 3 L / ha	Aplicar 3 a 4 pulverizações quando a queda das pétalas está a 75% e repetir em intervalos de 21 a 28 dias.
BATATAS	500 mℓ	Máximo de 4 L / ha	Aplicar durante a formação dos tubérculos e repetir em intervalos de 21 a 28 dias.
TOMATES, PIMENTOS, FEIJÕES, ERVILHAS, CEBOLAS	500 mℓ	Máximo de 4 L / ha	Iniciar as pulverizações antes da frutificação e repetir em intervalos de 14 a 21 dias.
TABACO	500 mℓ	Máximo de 4 L / ha	Aplicar 2 a 3 pulverizações quinzenais, quando a planta atingir de 30 cm de altura.