

ALEXIN

Lire attentivement l'étiquette avant utilisation

Complexe liquide de substances nutritives biologiques - Contient de l'acide salicylique

ENGRAIS DU GROUPE 2

INGRÉDIENTS ACTIFS :


Calcium (Ca).....26,4 g/kg (33,3 g/l)
Magnésium(Mg).....8,4 g/kg (10,6 g/l)
Potassium (K).....45 g/kg (56,7 g/l)
Boron (B).....2,375 g/kg (3,0 g/l)

LOT No :

Date de fabrication :

FABRICANT :

Nulandis, une division de l'AECI Limited
No d'enregistrement : 1924/002590/06
Boîte postale 14418
Witfield, 1467
Tél. : (011) 823 8000



MODE D'EMPLOI : CE PRODUIT DOIT ETRE EMPLOYE STRICTEMENT SELON LE MODE D'EMPLOI QUI FIGURE SUR LA PRESENTE ETIQUETTE.
• Ne pas mélanger **Alexin** à des produits à base de soufre ou de phosphite.

TABEAU D'APPLICATION :

CULTURES	DOSE	MÉTHODE D'APPLICATION
POMMES, POIRES	200 à 300 ml/100 l d'eau jusqu'à un maximum de 3 l/ha	Appliquer 3 ou 4 fois à partir de la mi-floraison, puis répéter à intervalles de 21 jours. Poires : Ne pas utiliser Alexin avec d'autres engrais foliaires ou adjuvants.
AGRUMES	200 à 300 ml/100 l d'eau jusqu'à un maximum de 3 l/ha	Appliquer 3 ou 4 fois à partir de la chute totale des pétales, puis répéter à intervalles de 28 jours.
CUCURBITACEES (CITROUILLES, PASTÈQUES, MELONS ET CON-COMBRES)	500 ml/100 l d'eau jusqu'à un maximum de 4 l/ha	Appliquer au moment de la floraison, puis répéter à intervalles de 21 jours.
LAITUES, CHOUX-FLEURS, CHOUX, CHOUX CHINOIS	500 ml/100 l d'eau jusqu'à un maximum de 3 l/ha	Commencer l'application avant le début de l'épiaison, puis répéter à intervalles de 14 à 21 jours.
PECHES, BRUGNONS, PRUNES, ABRICOTS, AMANDES, OLIVES	200 à 300 ml/100 l d'eau jusqu'à un maximum de 3 l/ha	Appliquer 3 ou 4 fois à partir de 75 % de la chute des pétales, puis répéter à intervalles de 21 à 28 jours. En conditions météorologiques propices aux infections bactériennes, envisager des applications supplémentaires.
POMMES DE TERRE	500 ml/100 l d'eau jusqu'à un maximum de 4 l/ha	Appliquer au démarrage de la tubérisation, puis répéter à intervalles de 21 à 28 jours.
TOMATES, POIVRONS, HARICOTS, PETIT-POIS, OIGNONS	500 ml/100 l d'eau jusqu'à un maximum de 4 l/ha	Commencer l'application avant la nouaison, puis répéter à intervalles de 14 à 21 jours.
TABAC	500 ml/100 l d'eau jusqu'à un maximum de 4 l/ha	Appliquer 2 ou 3 fois toutes les deux semaines, à partir du moment où le plant atteint 30 cm de hauteur.

IMPORTANT : AVANT D'APPLIQUER ALEXIN, S'ADRESSER À UN AGRONOME OU À UN CONSEILLER AGRICOLE QUALIFIÉ POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.