

يرجى القراءة قبل الاستخدام

الليكسن® ALEXIN

Jordanian Reg No. 8377
رقم تسجيل وزارة الزراعة الاردنية ٨٣٧٧

A liquid organic nutrient complex

مركب عناصر عضوي سائل

FERTILIZER GROUP 2

سماد زراعي (المجموعة ٢)

المواد الفعالة ACTIVE INGREDIENTS

Calcium	كالكسيوم	(Ca)	٢٦,٤ غ/كغ	26.4 g/kg	(33.3 g/l)
Magnesium	ماغنيسيوم	(Mg)	٨,٤ غ/كغ	8.4 g/kg	(10.6 g/l)
Potassium	بوتاسيوم	(K)	٤٥ غ/كغ	45 g/kg	(56.7 g/l)
Boron	بورون	(B)	٢,٣٧٥ غ/كغ	2.375 g/kg	(3.0 g/l)

Contents : المكونات

Batch No : رقم الدفعة

Date of Manufacture : تاريخ الانتاج

REGISTRATION HOLDER IN COUNTRY OF ORIGIN : حامل التسجيل في بلد المنشأ

Nulandis (A division of AECI Limited)

Reg. No. 1924/002590/06

P.O. Box 14418

Witfield, 1467

Tel : (011) 823 8000

NULANDIS®
unlocking nature's potential

A business of
AECI
Pests & Animal
Health

Alexin® is the registered trademark of AECI Ltd.

Alexin® علامة تجارية مسجلة لصالح شركة ايه سي اي ليميتد



P7044 JOR22/02 V2

ALEXIN® اليكسن

A liquid organic nutrient complex. مركب عناصر عضوي سائل

FERTILIZER GROUP 2	سماد زراعي (مجموعة ٢)
--------------------	-----------------------

ACTIVE INGREDIENTS المواد الفعالة:

Calcium كالسيوم (Ca)	٢٦,٤ غ/كغ	26.4 g/kg	(33.3 g/l)
Magnesium ماغنيسيوم (Mg)	٨,٤ غ/كغ	8.4 g/kg	(10.6 g/l)
Potassium بوتاسيوم (K)	٤٥ غ/كغ	45 g/kg	(56.7 g/l)
Boron بورون (B)	٢,٣٧٥ غ/كغ	2.375 g/kg	(3.0 g/l)

REGISTRATION HOLDER IN COUNTRY OF ORIGIN حامل التسجيل في بلد المنشأ
Nulandis (A division of AECl Limited)
Reg. No. 1924/002590/06
P.O. Box 14418
Witfield, 1467
Tel : (011) 823 8000

Alexin® is the registered trademark of AECl Ltd.
Alexin® علامة تجارية مسجلة لصالح شركة ايه اى سى اى ليميتد

DIRECTIONS FOR USE USE ONLY AS INDICATED طرق الاستخدام : يرجى الاستخدام فقط كما هو محدد

- Alexin should not be added with any sulphur or phosphite based products
- لا يحدد اضافة اليكسين مع اي منتج يحتوي على الكبريت او الفوسفات

APPLICATION TABLE قائمة الاستخدام

CROP المحصول	APPLICATION RATE معدل الاستخدام	APPLICATION METHOD طريقة الاستخدام
APPLES, PEARS التفاحيات و الايجاص	200-300 ml/100 l water to a maximum of 3 l/ha ٢٠٠ – ٣٠٠ مل/١٠٠ لتر مياه و في حد اقصى ٣ لتر/هكتار	Apply 3-4 applications from 50% flowering and repeat with 21 day intervals. For use on Pears: Do not combine Alexin with other foliar feeds or adjuvants. استخدام ٣ الى ٤ مرات بعد وصول الازهار لنسبة ٥٠ % و يعاد الاستخدام كل ٢١ يوم. للاستخدام على اشجار الايجاص: لا تخلط اليكسين مع اسمدة ورقية او مواد لاصقة و ناشرة
CITRUS الحمضيات	200-300 ml/100 l water to a maximum of 3 l/ha ٢٠٠ – ٣٠٠ مل/١٠٠ لتر مياه و في حد اقصى ٣ لتر/هكتار	Apply 3 – 4 applications from 100 % petal drop and repeat with 28 day intervals. يستخدم ٣-٤ مرات بعد سقوط بتلات الازهار، مرة كل ٢٨ يوم
CUCURBITS (PUMPKINS, WATERMELONS, MELONS AND CUCUMBERS) القرعيات	500 ml /100 l water to a maximum of 4 l/ha ٥٠٠ مل/١٠٠ لتر مياه و في حد اقصى ٤ لتر/هكتار	Apply at flowering and repeat with 21 day intervals. استخدام عند الازهار و يعاد الاستخدام كل ٢١ يوم
LETTUCE, CAULIFLOWER, CABBAGE, CHINESE CABBAGE الخس , الزهرة , الملفوف , الملفوف الصيني	500 ml/100 l water to a maximum of 3 l/ha ٥٠٠ مل/١٠٠ لتر مياه و في حد اقصى ٣ لتر/هكتار	Begin applications prior to onset of head formation and repeat at 14 to 21 day intervals. بدء الاستخدام قبل لف الرأس و يعاد الاستخدام كل ١٤ – ٢١ يوم
PEACHES, NECTARINES, PLUMS, APRICOTS, ALMONDS, OLIVES الدراق , النكترين, الخوخ, المشمش, اللوز , الزيتون	200-300 ml/100 l water to a maximum of 3 l/ha ٢٠٠ – ٣٠٠ مل/١٠٠ لتر مياه و في حد اقصى ٣ لتر/هكتار	Apply 3-4 applications from 75% petal drop and repeat with 21 to 28 day intervals. If weather conditions favour bacterial infections, additional applications can be considered. يستخدم ٣-٤ مرات بعد سقوط ٧٥% من بتلات الازهار، مرة كل ٢١ – ٢٨ يوم. اذا كانت الظروف الجوية مناسبة للاصابات البكتيرية يمكن رفع نسب الاستخدام
POTATOES البطاطا	500 ml/100 l water to a maximum of 4 l/ha ٥٠٠ مل/١٠٠ لتر مياه و في حد اقصى ٤ لتر/هكتار	Apply at tuber initiation and repeat every 21 to 28 days. استخدام عند بدء تكون الدرنات و يعاد الاستخدام كل ٢١ – ٢٨ يوم
TOMATOES, PEPPERS, BEANS, PEAS, ONIONS البندورة , الفلفل, فول , فاصولياء, بصل	500 ml/100 l water to a maximum of 4 l/ha ٥٠٠ مل/١٠٠ لتر مياه و في حد اقصى ٤ لتر/هكتار	Begin applications prior to fruit set and repeat at 14 to 21 day intervals. بدء الاستخدام قبل العقد و يعاد الاستخدام كل ١٤ – ٢١ يوم
TOBACCO التبغ	500 ml/100 l water to a maximum of 4 l/ha ٥٠٠ مل/١٠٠ لتر مياه و في حد اقصى ٤ لتر/هكتار	Apply 2 – 3 applications bi-weekly, starting at 30 cm height. استخدام ٢ – ٣ مرات مرتين بالاسبوع ابتداء من وصول طول النبات الى ٣٠ سم

IMPORTANT: BEFORE APPLYING ALEXIN, CONSULT A QUALIFIED AGRONOMIST OR AGRICULTURAL ADVISER ON THE USE THEREOF.

هام: قبل استخدام الاليكسين يرجى استشارة مهندس زراعي