




good chemistry

ALEXIN®



ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

Nº do registo: DSV -209

Complexo nutritivo líquido contendo ácido salicílico

GRUPO 2 FERTILIZANTE

COMPOSIÇÃO:

Cálcio (Ca) 3.33 %m/v
Magnésio (Mg) 1.06 %m/v
Boro (B) 0.3% m/v
Potássio (K) 56.7 %m/v

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Volume líquido:

Agente:

AECI® Moçambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
T +258 84/82 274 7440

Fabricante:

AECI Plant Health uma divisão da AECI® Ltd
14 Field Road,
Boksburg
Republica da África do Sul
T +27 (11) 823 8000

UN No. Not Regulated / Não Regulado



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

P7042 MOZ06/23 V2

Irritante ocular

**PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.**



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO

CULTURA	TAXA DE APLICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
MAÇÃS, PERAS	200-300 ml/100ℓ de água até a um máximo de 3 ℓ/ha	Aplicar 3 a 4 pulverizações quando a floração está a 50% e repetir em intervalos de 21 dias. Para utilização em Peras: Não misturar Alexin com outros adjuvantes ou alimentação foliar.
CITRINOS	200-300 ml/100ℓ de água até a um máximo de 3 ℓ/ha	Aplicar 3 a 4 pulverizações a partir da queda total das pétalas e repetir em intervalos de 28 dias.
CUCURBITÁCEAS (ABÓBORAS, MELÂNCIAS, MELÕES E PEPINOS)	500 ml /100 ℓ de água até a um máximo de 4 ℓ/ha	Aplicar na altura da floração e repetir em intervalos de 21 dias.
ALFACE, COUVE-FLOR, COUVE, COUVE CHINESA	500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 3 ℓ/ha	Iniciar as pulverizações antes da formação da cabeça e repetir em intervalos de 14 a 21 dias.
PÊSSEGOS, NECTARINAS, AMEIXAS, DAMASCOS AMÊNDOAS, AZEITONAS	200-300 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 3 ℓ/ha	Aplicar 3 a 4 pulverizações quando a queda das pétalas está a 75% e repetir em intervalos de 21 a 28 dias. Se as condições atmosféricas forem propícias a infecções bacterianas, devem ser consideradas pulverizações adicionais.
BATATAS	500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 4 ℓ/ha	Aplicar durante a formação dos tubérculos e repetir em intervalos de 21 a 28 dias.
TOMATES, PIMENTOS, FEIJÕES, ERVILHAS, CEBOLAS	500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 4 ℓ/ha	Iniciar as pulverizações antes da frutificação e repetir em intervalos de 14 a 21 dias.
TABACO	500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 4 ℓ/ha	Aplicar 2 a 3 pulverizações quinzenais, quando a planta atingir de 30 cm de altura.

IMPORTANTE: ANTES DE PROCEDER À APLICAÇÃO DE ALEXIN, CONSULTE UM AGRÔNOMO QUALIFICADO OU UM ASSESSOR AGRÍCOLA SOBRE A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

Alexin® é uma marca registada da AECI Limited (Nulandis® uma divisão da AECI Limited)