

CALCIMAX

كالمسي ماكس

Jordanian Registration No. 8381

رقم تسجيل وزارة الزراعة الاردنية ٨٣٨١

LIQUID CALCIUM COMPLEX

مركب كالمسيوم سائل

A liquid calcium complex for use as a foliar nutrient on various crops to prevent or correct calcium deficiencies and related physiological disorders.

مركب كالمسيوم سائل للاستخدام كسماد ورقي على مختلف المحاصيل لمنع أو تصحيح نقص الكالمسيوم و الاضطرابات الفسيولوجية ذات صلة بنقص الكالمسيوم

FERTILIZER GROUP 2

مجموعة السماد ٢

COMPOSITION:			التركيبية الكيميائية
Calcium (Ca) (Carbohydrate chelate complex)	78.5 g/kg (100 g/l)	٧٨.٥ غ/كغ (١٠٠ غرام/لتر)	كالمسيوم مركب كربوهيدرات مخلب
Boron (B)	5.08 g/kg (6.5 g/l)	٥.٠٨ غ/كغ (٦.٥ غرام/لتر)	بورون

CONTENTS:

المكونات:

BATCH NO:

رقم الدفعة:

DATE OF MANUFACTURE:

تاريخ التصنيع:

UN NO.: Not regulated

رقم يو إن, غير منظم

REGISTRATION HOLDER IN COUNTRY OF ORIGIN: حامل التسجيل في بلد المنشأ

Nulandis® (A division of AECL Limited)

Reg. No. 1924/002590/06

P.O. Box 14418

Witfield, 1467

Tel : (011) 823 8000

www.nulandis.com

NULANDIS®
unlocking nature's potential

A business of
AECL
Plant & Animal
Health

Exclusive Distributor in Jordan – Eastern Company

الوكيل الحصري في الاردن – الشركة الشرقية



P7227

CALCIMAX كالسي ماكس

Jordanian Registration No. 8361

رقم تسجيل وزارة الزراعة الأردنية ٨٣٨١

LIQUID CALCIUM COMPLEX	مركب كالسيوم سائل
A liquid calcium complex for use as a foliar nutrient on various crops to prevent or correct calcium deficiencies and related physiological disorders.	
مركب كالسيوم سائل للاستخدام كسماد ورقي على مختلف المحاصيل لمنع أو تصحيح نقص الكالسيوم و الاضطرابات الفسيولوجية ذات صلة بنقص الكالسيوم	
FERTILIZER GROUP 2	مجموعة السماد ٢
التركيب الكيميائي	
COMPOSITION:	
Calcium (Ca) (Carbohydrate chelate complex)	78.5 g/kg (100 g/l)
Boron (B)	5.08 g/kg (6.5 g/l)

CONTENTS:

BATCH NO:

DATE OF MANUFACTURE:

UN NO.: Not regulated

المكونات:

رقم الدفعة:

تاريخ التصنيع:

رقم يون أن، غير منظم

REGISTRATION HOLDER IN COUNTRY OF ORIGIN:

Nulandis® (A division of AECI Limited)

Reg. No. 1924/002590/06

P.O. Box 14418

Witfield, 1467

Tel : (011) 823 8000

www.nulandis.com

Exclusive Distributor in Jordan – Eastern Company

الوفيل الحصري في الأردن – الشركة الشرقية

DIRECTIONS FOR USE :

USE ONLY AS INDICATED

طرق الاستخدام : يرجى الاستخدام فقط كما هو محدد

CALCIMAX is compatible with most commonly used foliar feeds. Do not use with products which contain high phosphorous, phosphite and sulphur levels including Lime sulphur or Bordeaux mixture. However, it is recommended to do a compatibility test on a small area and observe the treated area for 3 days before doing commercial applications. Where overhead systems are in use, avoid scheduling irrigation directly after application. In orchards equipped with micro irrigation systems, spray deposits should not be affected by irrigation. Use the lower concentration for maintenance and the higher concentration for sufficient uptake.

يمكن استخدام كالسي ماكس مع معظم الاسمدة الورقية. لا يستخدم مع المواد التي تحتوي على نسب مرتفعة من الفوسفور و الفوسفات و الكبريت (كبريت الالام و كبريت خليط بورنو). اخذاً ذلك بعين الاعتبار، يوصى باجراء فحص توافق على مساحة صغيرة و مراقبة المنطقة (المعالجة لمدة ٣ ايام قبل القيام بالاستخدام بشكل عام. عند استخدام المحاور الزراعية تحجب الري، ماثورة بعد الاستخدام. في مزارع الشجرية المجردة بالتغطية الري صغيرة النطاق لا ينبغي ان تتأثر راسب الرش بالري. استخدم التركيز المنخفض للاستخدام المتواصل و التركيز الاعلى للامتصاص الكافي.

CROP	DOSAGE/ha OR AS INDICATED	APPLICATION METHOD
المنتج	كمية الاستخدام \ هكتار او كما هو مبين	طريقة الاستخدام
POMEFRUIT: Apples (Bitter pit) Pears	450 mL / 100 l water to a maximum of 15 l/ha	Apply as a high volume foliar application in a regular programme commencing with 7 – 10 day intervals (6 – 8 sprays and 6 – 12 sprays for Bitter Pit sensitive cultivars). Young active growing bearing orchards where shoot length of more than 45 cm occurs, should receive at least 8 applications. Apply in 1 000 – 3 000 l spray mixture per ha with lower volumes on young open trees and the higher volume sprays on large dense trees.
Citrus	300 - 500 mL/100 l water to a maximum of 15 l/ha	Apply as a medium cover spray in 1 000 - 3 000 l water/ha. Apply at fruit set.
Potatoes (Hollow heart, Brown spot) (improved shelf life and heat tolerance)	500 mL/100 l water to a maximum of 4 l/ha	Apply at tuber initiation followed by a further 3 sprays with 10 - 14 day intervals. Apply in no less than 500 l water/ha.
Tomatoes (Blossom-end rot)	500 mL/100 l water to a maximum of 4 l/ha	Apply from first fruit set and repeat at 7 to 10 day intervals. Apply in no less than 500 l water/ha.
Cucurbits (Watermelons, Cucumbers, etc.) (Blossom-end rot)	500 mL/100 l water to a maximum of 3 l/ha	Apply from first fruit set and repeat at 14 day intervals. Apply in no less than 500 l water/ha.
Brassicac Lettuce	500 mL/100 l water to a maximum of 3 l/ha	Apply 2 - 3 sprays in a regular programme with 7 to 10 day intervals from heading. Apply in no less than 300 l water/ha.
Celery (Black heart)	500 mL/100 l water to a maximum of 3 l/ha	Apply in a regular programme with 7 day intervals as a directed spray after establishment of transplanted seedlings. Apply in no less than 300 l water/ha.

SUBTROPICAL FRUIT & NUTS Mangoes, Avocados, Macadamias, Pecan nuts, Bananas, Litchi (Fruit colouring and internal fruit quality)	500 mL/100 l water to a maximum of 15 l/ha	Apply as a medium cover spray in 1 000 - 3 000 l water/ha during flowering and apply a follow-up spray, two weeks later.
STONEFRUIT: Apricots, Peaches, Plums	500 mL/100 l water to a maximum of 5 l/ha	Apply from fruit set as a medium cover spray in 1 000 - 3 000 l water/ha, with 14 day intervals. Apply as a preventative treatment against Internal Breakdown during early Spring. Apply 6 applications with 14 day intervals.
Grapes	450 – 500 mL / 100 l water to a maximum of 750 mL / 100 l water	Apply 4 – 6 times from pea size onwards. Apply with 7 to 10 day intervals until symptoms disappear. Apply in 1 000 l water / ha.
Ornamentals	500 mL/100 l water to a maximum of 5 l/ha	Apply 2 – 3 applications with weekly intervals until symptoms disappear. Ensure thorough wetting of plants.

NOTE: Spray volumes will be determined by the actual tree or plant size. The dosage is dependent on the magnitude of the deficiency.

احجام محاليل الرش تعتمد على حجم الشجرة او النبات، تعتمد الجرعة على حسب حجم مشكلة نقص العنصر

IMPORTANT: Before applying Calcimax consult a qualified Agronomist or an Agricultural Adviser on the necessity of using it.

هام: قبل استخدام الالكسين يرجى استشارة مهندس زراعي