



good chemistry

CALCIMAX



Nº do registo: DSV -207

Um complexo de cálcio em forma líquida para utilização como nutriente foliar em diversas culturas para evitar ou corrigir deficiências de cálcio e doenças fisiológicas relacionadas.

COMPOSIÇÃO:

Cálcio (Ca) 10.0 %m/v
(Complexo quelant de hidratos de carbono)
Boro (B) 0.65% m/v

Agente:

AECI® Moçambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
T +258 84/82 274 7440

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

GRUPO 2 FERTILIZANTE

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Volume líquido:

Fabricante:

AECI Plant Health uma divisão da AECI® Ltd
14 Field Road,
Boksburg
Republica da África do Sul
T +27 (11) 823 8000

UN No. Not Regulated / Não Regulado

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

P7042 MOZ06/23 V2

PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.

Não Perigoso



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO

- CALCIMAX é compatível com a maioria dos pesticidas, fungicidas e alimentação foliar frequentemente utilizados, à excepção daqueles que contêm alto teor sulfuroso, de fósforo e fosfito incluindo a Calda Sulfocálcica ou a Calda Bordalesa.
- Quando se utilizam sistemas de irrigação por aspersão, deve evitar-se a irrigação programada logo a seguir à aplicação. Em pomares equipados com sistemas de micro irrigação, os depósitos da pulverização não devem ser afectados pela irrigação.
- Utilizar a concentração mais baixa para manutenção e a concentração mais alta para absorção suficiente.

TABELA DE APLICAÇÃO:

CULTURA	DOSAGEM/ha OU COMO INDICADO	MÉTODO DE APLICAÇÃO
POMÓIDEAS (Pevides) Maças (<i>Bitter pit</i> / Mancha amarga) Peras	450 ml + 10 ml de Biodew / 100 ℓ de água até a um máximo de 15 ℓ / ha	Aplicar como pulverização foliar de alto volume, num programa regular, começando a meados de Novembro até Janeiro/ Fevereiro com intervalos de 7 a 10 dias (6-8 pulverizações e 6-12 pulverizações para as culturas sensíveis à mancha amarga/ <i>bitter pit</i>). Árvores frutíferas em crescimento activo, com rebentos superiores a 45 cm, devem ser pulverizadas pelo menos 8 vezes. Aplicar em 1000 – 3000 ℓ de mistura de pulverização por hectare de baixo volume para árvores jovens abertas e de alto volume para árvores grandes e densas.
Citrinos	300 - 500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 15 ℓ/ha	Aplicar como pulverização de cobertura média em 1000 - 3000 ℓ de água/ha. Aplicar na frutificação – formação do fruto.
Batatas (Coração oco, Manchas internas) (prazo de validade melhorado e tolerância ao calor)	500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 4 ℓ/ha	Aplicar na formação dos tubérculos, com 3 pulverizações adicionais em intervalos de 10 a 14 dias. Aplicar em não menos do que 500 ℓ de água/ha.
Tomates Pimentos (Podridão apical)	500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 4 ℓ/ha	Aplicar a partir da frutificação e repetir em intervalos de 7 a 10 dias. Aplicar em não menos do que 500 ℓ de água/ha.
Cucurbitáceas (Melancias, Pepinos, etc.) (Podridão apical)	500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 3 ℓ/ha	Aplicar a partir da formação dos primeiros frutos e repetir em intervalos de 14 dias. Aplicar em não menos do que 500 ℓ de água/ha.
Brássicas Alface	500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 3 ℓ/ha	Aplicar 2 - 3 pulverizações num programa regular com intervalos de 7 a 10 dias a partir da formação da cabeça. Aplicar em não menos do que 300 ℓ de água/ha. Adicionar um agente humidificante como Biodew .
Aipo (Coração preto)	500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 3 ℓ/ha	Aplicar num programa regular com intervalos de 7 dias, como pulverização direccionada, após o estabelecimento das plântulas transplantadas. Aplicar em não menos do que 300 ℓ de água/ha.

CULTURA	DOSAGEM/ha OU COMO INDICADO	MÉTODO DE APLICAÇÃO
FRUTA SUBTROPICAL + NOZES Mangas, Pêra Abacate, Macadâmias, Noz-pecã, Bananas, Litchis (Cor da fruta e qualidade da polpa da fruta)	500 mL/100 ℓ de água até a um máximo de 15 ℓ/ha	Aplicar como pulverização de cobertura média em 1 000 - 3 000 ℓ de água/ha durante a floração e efectuar uma pulverização adicional duas semanas mais tarde.
PRUNÓIDEAS (Caroço): Damascos, Pêssegos, Ameixas	500 mL / 100 ℓ de água até a um máximo de 5 ℓ/ha 250 mL + 10 mL BiodeW / 100 ℓ de água até a um máximo de 7,5 ℓ / ha	Aplicar a partir da frutificação como pulverização de cobertura média em 1 000 - 3 000 ℓ de água/ha, em intervalos de 14 dias. Aplicar com tratamento preventivo contra a Degenerescência Interna durante o princípio da Primavera. Aplicar 6 pulverizações em intervalos de 14 dias.
Uvas	450 – 500 mL / 100 ℓ de água até a um máximo de 750 mL / 100 ℓ de água	Aplicar 4 a 6 vezes a partir da altura em que os bagos têm o tamanho de ervilha e daí por diante. Aplicar em intervalos de 7 a 10 dias até que desapareçam os sintomas. Aplicar em 1 000 ℓ de água / ha.
Plantas ornamentais	500 mL / 100 ℓ de água até a um máximo de 5 ℓ / ha.	Aplicar 2 a 3 pulverizações semanalmente até que os sintomas desapareçam. Assegurar uma boa humedificação das plantas.

NOTA: Os volumes de pulverização serão determinados pela própria planta ou seu tamanho. A dosagem está dependente da intensidade da deficiência.

IMPORTANTE: Antes de proceder à aplicação de CALCIMAX consulte um agrónomo qualificado ou um assessor agrícola sobre a utilização deste produto.

BIODEW é uma marca registada da AECI Limited