

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

Cu-MAX

Um complexo de cobre orgânico e líquido para ser usado como pulverização foliar em diversas culturas com o objectivo de prevenir ou corrigir a deficiência de cobre.

Nº do registo: DSV – 218

COMPOSIÇÃO:

Cobre (Cu)..... 5.0 %m/v

FERTILIZANTE: GRUPO 2

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Volume líquido:

Agente:

AECI Mozambique, Limitada

Rua da Imprensa, Número 312,

19º andar - Esquerda

Cidade de Maputo, Moçambique

TEL: +263 712 613 068



Fabricante:

Nulandis® uma divisão da AECI Ltd

14 Field Road

Boksburg, República da África do Sul

TEL: +27 (11) 823 8000



Nulandis® é uma marca registada da AECI Limited (Nulandis® uma divisão da AECI Limited)

UN No.: Not Regulated



**PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.**

Causa irritação nos olhos e na pele. Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros

P7307

Cu-MAX

FERTILIZANTE: GRUPO 2

Um complexo de cobre orgânico e líquido para ser usado como pulverização foliar em diversas culturas com o objectivo de prevenir ou corrigir a deficiência de cobre.

COMPOSIÇÃO:

Cobre (Cu)..... 5.0 %m/v

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Usar apenas como indicado

- **Cu-MAX** é compatível com a maioria dos pesticidas e fertilizantes foliares frequentemente utilizados, à excepção dos fertilizantes foliares com alto teor de fósforo.
- Não misturar **Cu-MAX** com matérias altamente alcalinas como a Calda Sulfocálcica e a Calda Bordalesa.
- Quando se utilizam sistemas de irrigação por aspersão, deve evitar-se a irrigação programada logo a seguir à aplicação. Em pomares equipados com sistemas de micro-irrigação, os depósitos da pulverização não devem ser afectados pela irrigação.
- Utilizar a concentração mais baixa para manutenção e a concentração mais alta para suficiente absorção.

CULTURA	TAXA DE DOSAGEM/ha OU COMO INDICADO	DETALHES DE APLICAÇÃO
FRUTA: Pomóideas, Prunóideas, Frutos Perenes, Frutos Subtropicais, Citrimos	40 – 50 ml/100 l de água até a um máximo de 500 ml/ha	Aplicar num mínimo de 1 000- 5 000 l de água/ha. Citrimos: Aplicar antes da floração em Setembro, e repetir 3-4 semanas mais tarde se necessário. Outros frutos: Aplicar no início da formação dos botões de flor e quando a queda das pétalas atinge 75%.
Trigo, Cevada, Aveia, Milho, Cebolas, Beterraba	150 – 200 ml/100 l de água até a um máximo de 500 ml/ha	Aplicar 1 a 2 pulverizações. Para melhores resultados, aplicar no início da estação, quando ainda há suficiente folhagem para absorver a pulverização. Aplicar num mínimo de 200 l de água/ha. Cebolas: Aplicar a partir da altura em que os bolbos têm o tamanho de bola de golfe e repetir 14 dias mais tarde. Aplicar num mínimo de 500 l de água/ha.
Pastagens	500 ml - 1 l/ha	Aplicar no começo da estação antes do início do período vegetativo da primavera. Repetir entre os cortes para silagem ou feno. Nota: Manter o gado fora das áreas pulverizadas durante 2 semanas.
Coníferas	1 l/ha	Aplicar em árvores de segunda geração por via aérea, ULV ou através de pulverizadores convencionais.

NOTA:

O VOLUME E DOSE DE PULVERIZAÇÃO SERÃO DETERMINADOS PELO TAMANHO REAL DA ÁRVORE OU PLANTA.

IMPORTANTE:

ANTES DE PROCEDER À APLICAÇÃO DE Cu-MAX, CONSULTAR UM AGRÔNOMO QUALIFICADO OU UM ASSESSOR AGRÍCOLA SOBRE A SUA UTILIZAÇÃO.