

دبل ماكس® DOUBLE MAX

Jordanian Registration No. 8384

رقم تسجيل وزارة الزراعة الاردنية ٨٣٨٤

A liquid organic calcium and- magnesium complex for correction of deficiency symptoms of crops as listed.

مركب كالسيوم و ماغنيسيوم عضوي سائل يستخدم لتصحيح اعراض النقص على جميع المحاصيل

FERTILIZER GROUP 2

مجموعة السماد ٢

COMPOSITION:		التركيبية الكيميائية	
Calcium (Ca)	80 g / ℓ	٨٠ غرام \ لتر	كاليسيوم
Magnesium (Mg)	15 g / ℓ	١٥ غرام \ لتر	ماغنيسيوم
Boron (B)	6.3 g / ℓ	٦.٣ غرام \ لتر	بورون

CONTENTS:

المكونات:

BATCH NO:

رقم الدفعة:

DATE OF MANUFACTURE:

تاريخ التصنيع:

UN NO.: Not regulated

رقم يو إن, غير منظم

REGISTRATION HOLDER IN COUNTRY OF ORIGIN: حامل التسجيل في بلد المنشأ

Nulandis® (A division of AECl Limited)

Reg. No. 1924/002590/06

P.O. Box 14418

Witfield, 1467

Tel : (011) 823 8000

www.nulandis.com

NULANDIS®
unlocking nature's potential

A business of
AECl
Plant & Animal
Health

Exclusive Distributor in Jordan – Eastern Company

الوكيل الحصري في الاردن – الشركة الشرقية



P6233

دبل ماكس® DOUBLE MAX

Jordanian Registration No. 8384

رقم تسجيل وزارة الزراعة الأردنية ٨٣٨٤

A liquid organic calcium and- magnesium complex for correction of deficiency symptoms of crops as listed.

مركب كالكسيوم و ماغنيسيوم عضوي سائل يستخدم لتصحيح اعراض النقص على جميع المحاصيل

FERTILIZER GROUP 2	مجموعة السماد ٢
--------------------	-----------------

COMPOSITION:		التركيب الكيميائي	
Calcium (Ca)	80 g /l	٨٠ غرام \ لتر	الكالسيوم
Magnesium (Mg)	15 g / l	١٥ غرام \ لتر	المغنيسيوم
Boron (B)	6.3 g / l	٦.٣ غرام \ لتر	بورون

CONTENTS: المكونات:
BATCH NO: رقم الدفعة:
DATE OF MANUFACTURE: تاريخ التصنيع:
UN NO.: Not regulated رقم يو ان, غير منظم

REGISTRATION HOLDER IN COUNTRY OF ORIGIN: حامل التسجيل في بلد المنشأ:
Nulandis® (A division of AECI Limited)
Reg. No. 1924/002590/06
P.O. Box 14418
Witfield, 1467
Tel : (011) 823 8000
www.nulandis.com

Exclusive Distributor in Jordan – Eastern Company
الوكيل الحصري في الأردن – الشركة الشرقية

DOUBLE MAX is a liquid organic calcium and magnesium complex for use as a foliar nutrient on various crops to prevent or correct calcium and magnesium deficiencies.

دبل ماكس مركب كالكسيوم و ماغنيسيوم عضوي سائل يستخدم كسماد ورقي لتصحيح اعراض نقص الكالسيوم و الماغنيسيوم على جميع المحاصيل

DIRECTIONS FOR USE
Use only as indicated:

طرق الاستخدام
يرجى الاستخدام فقط كما هو محدد

DOUBLE MAX is compatible with foliar feeds, except foliar feeds with a high phosphorous content. It is recommended to do a compatibility test on a small area and observe the treated area for 3 days before doing commercial applications.

يمكن استخدام دبل ماكس مع معظم الأسمدة الورقية. لا يستخدم مع المواد التي تحتوي على نسب مرتفعة من الفوسفور و الفوسفات. يوصى بأجراء فحص توافق على مساحة صغيرة و مراقبة المنطقة المعالجة لمدة ٣ أيام قبل القيام بالاستخدام بشكل عام.

Do not mix **DOUBLE MAX** with highly alkaline materials such as Lime Sulphur or Bordeaux Mixture.

لا يستخدم مع المواد القلوية الشديدة كالكبريت (كبريت اللايم و كبريت خليط بوردو)

Where overhead systems are in use, avoid scheduling irrigation directly after application. In orchards equipped with micro irrigation systems, spray deposits should not be affected by irrigation.

عند استخدام المحاور الزراعية تجنب الري مباشرة بعد الاستخدام. في مزارع الشجرية المجهزة بأنظمة الري صغيرة النطاق لا ينبغي ان تتكرر رواسب الرش بالري.

Use the lower concentration for maintenance, and the higher concentration for sufficient uptake.

استخدم التركيز المنخفض للاستخدام المتواصل و التركيز الأعلى للأمتصاص الكافي.

Do not use in combination with **BLADBUFF 5**

لا يستخدم مع مادة بلاد بف ٥

CROP	DOSAGE/ha OR AS INDICATED	APPLICATION METHOD
المنتج	كمية الاستخدام \ هكتار او كما هو مبين	طريقة الاستخدام
GRAPES	500 mL/100 l water to a maximum of 5 l/ha ٥٠٠ مل \ ١٠٠ لتر مياه بعد اقصاد ٥ لتر\ هكتار	Apply first spray when fruit has reached pea size stage. Repeat three times with 14 day intervals. يستخدم عندما تكون حجم حبة العنب بحجم حبة البازلاء. يعاد الاستخدام ٣ مرات كل ١٤ يوم
CITRUS	500 mL/100 l water to a maximum of 10 l/ha ٥٠٠ مل \ ١٠٠ لتر مياه بعد اقصاد ١٠ لتر\ هكتار	Apply as a medium cover spray in 1 000 – 3 000 l water/ha. Apply first application 100% petal drop. Repeat 1-2 times if necessary. يستخدم كغطاء متوسط على الاشجار بتلك خلط ١٠٠٠-٣٠٠٠ لتر مياه للهكتار. استخدم سقوط البتلات. يجب اعادة الاستخدام بعد من مرة الى مرتين.
POME FRUIT: Apples, Pears	500 mL/100 l water to a maximum of 5 l/ha ٥٠٠ مل \ ١٠٠ لتر مياه بعد اقصاد ٥ لتر\ هكتار	Apply as a high volume spray in 1 000 – 3 000 l water/ha, depending on the tree size. Repeat 7-10 day intervals. يستخدم كغطاء عالي على الاشجار بتلك خلط ١٠٠٠-٣٠٠٠ لتر مياه للهكتار حسب حجم الشجر. يتم الاستخدام كرش ورقي ضمن البرنامج الاعتيادي كل ٧-١٠ ايام
STONE FRUIT: Apricots, Plums, Peaches	500 mL/100 l water to a maximum of 8 l/ha ٥٠٠ مل \ ١٠٠ لتر مياه بعد اقصاد ٨ لتر\ هكتار	Apply as a medium cover spray in 1 000 – 3 000 l water/ha. Apply a total of 6 applications with 14 day intervals. يستخدم كغطاء متوسط على الاشجار بتلك خلط ١٠٠٠-٣٠٠٠ لتر مياه للهكتار. استخدم كحد اعلاه ٦ مرات. يجب اعادة الاستخدام كل ١٤ يوم.
SUB-TROPICAL FRUIT: Mangoes, Guavas, Litchis, Macadamias	500 mL/100 l water to a maximum of 15 l/ha ٥٠٠ مل \ ١٠٠ لتر مياه بعد اقصاد ١٥ لتر\ هكتار	Apply during flowering as a medium cover spray in 1 000 – 3 000 l water/ha. Apply a follow-up spray 14 days later. يستخدم خلال الازهار كغطاء متوسط على الاشجار بتلك خلط ١٠٠٠ - ٣٠٠٠ لتر مياه للهكتار. يجب اعادة الاستخدام بعد ١٤ يوم
POTATOES	500 mL/100 l water to a maximum of 4 l/ha ٥٠٠ مل \ ١٠٠ لتر مياه بعد اقصاد ٤ لتر\ هكتار	Apply first spray with tuber initiation. Repeat every 14 to 21 days. استخدم عند بدء الترنات و يعاد الاستخدام كل ١٤ – ٢١ يوم

CROP	DOSAGE/ha OR AS INDICATED	APPLICATION METHOD
المنتج	كمية الاستخدام \ هكتار او كما هو مبين	طريقة الاستخدام
VEGETABLES AND FIELD CROPS: Cruciferae, Cucumbers, Celery, Peas, Peppers, Onions, Lettuce, Tomatoes, Maize	500 mL/100 l water to a maximum of 4 l/ha ٥٠٠ مل \ ١٠٠ لتر مياه بعد اقصاد ٤ لتر\ هكتار	Apply from first fruit set or heading and repeat at 7-10 day intervals. Apply in 300 – 500 l water/ha. استخدم عند بداية العقد و يعاد الاستخدام كل ٧ – ١٠ ايام. كمية استخدام المادة حسب الجدول و على ان لا يتم خلط المادة بأقل من ٣٠٠ - ٥٠٠ لتر مياه \ هكتار
GROUNDNUTS	500 mL/100 l water to a maximum of 3 l/ha ٥٠٠ مل \ ١٠٠ لتر مياه بعد اقصاد ٣ لتر\ هكتار	Apply in 300 – 500 l water/ha. Apply early in the season when plants have sufficient leaves to absorb the spray. كمية استخدام المادة حسب الجدول و على ان لا يتم خلط المادة بأقل من ٣٠٠ - ٥٠٠ لتر مياه \ هكتار يستخدم في بداية عمر النبات عندما يصبح للنبات الاكثانية لامتصاص المادة
PAPRIKA	500 mL/100 l water to a maximum of 3 l/ha ٥٠٠ مل \ ١٠٠ لتر مياه بعد اقصاد ٣ لتر\ هكتار	Apply when deficiency symptoms appear. Repeat if necessary. Apply in 300 – 500 l water/ha. يستخدم عند ظهور اعراض نقص. كمية استخدام المادة حسب الجدول و على ان لا يتم خلط المادة بأقل من ٣٠٠ - ٥٠٠ لتر مياه \ هكتار

NOTE: Spray volumes will be determined by the actual tree or plant size. The dosage is dependent on the magnitude of the deficiency.

احجام محاليل الرش تعتمد على حجم الشجرة او النبات. تعتمد الجرعة على حسب حجم مشكلة نقص الغصن

IMPORTANT: Before applying Calcimax consult a qualified Agronomist or an Agricultural Adviser on the necessity of using it.

هام: قبل استخدام دبل ماكس يرجى استشارة مهندس زراعي