

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

DOUBLE MAX

Um complexo de cálcio e magnésio, líquido e orgânico, para correcção de sintomas de deficiência das culturas, conforme listado.

Nº do registo: DSV – 603

COMPOSIÇÃO:

Cálcio (Ca) 8.0 %m/v
Magnésio (Mg) 1.5 %m/v
Boro (B) 0.63 %m/v

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Volume líquido:

Agente:

AECI Mozambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
TEL: +263 712 613 068



Fabricante:

Nulandis® uma divisão da AECI Ltd
14 Field Road
Boksburg, República da África do Sul
TEL: +27 (11) 823 8000



A business of



Plant & Animal
Health

Nulandis® é uma marca registada da AECI
Limited (Nulandis® uma divisão da AECI Limited)

UN No.: Not Regulated / Não Regulado

Não Perigoso

PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.

DOUBLE MAX

COMPOSIÇÃO:

Cálcio (Ca) 8.0 %m/v
Magnésio (Mg) 1.5 %m/v
Boro (B) 0.63 %m/v

Um complexo de cálcio e magnésio, líquido e orgânico, para correcção de sintomas de deficiência das culturas, conforme listado.

DOUBLE MAX é um complexo de cálcio e magnésio, líquido e orgânico, para utilização como nutriente foliar em várias culturas com o fim de evitar ou corrigir deficiências de cálcio e magnésio.

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO.

- DOUBLE MAX** é compatível com a maioria dos pesticidas e alimentação foliar frequentemente utilizados, à excepção de alimentação foliar com um alto teor fosfórico.
- Não misturar **DOUBLE MAX** com matéria alcalina como sejam a Calda Sulfocálcica e a Calda Bordalesa.
- Quando se utilizam sistemas de irrigação por aspersão, deve evitar-se a irrigação programada logo a seguir à aplicação. Em pomares equipados com sistemas de micro irrigação, os depósitos da pulverização não devem ser afectados pela irrigação.
- Utilizar a concentração mais baixa para manutenção e a concentração mais alta para absorção suficiente.
- Não utilizar em combinação com **BLADBUFF 7** ou **BLADBUFF 12**.

CULTURA	TAXA DE APLICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
UVAS	500 mℓ/100 ℓ de água até a um máximo de 5 ℓ/ha	Aplicar a primeira pulverização quando a fruta atingir o tamanho de ervilha. Repetir 3 vezes em intervalos de 14 dias.
CITRINOS	500 mℓ/100 ℓ de água até a um máximo de 10 ℓ /ha	Aplicar como pulverização de cobertura média em 1000 – 3000 ℓ de água/ha. A primeira pulverização é feita na queda total das pétalas. Repetir 1-2 vezes se necessário.
ÁRVORES DE POMÓIDEAS: Maçãs, Pêras	500 mℓ/100 ℓ de água até a um máximo de 5 ℓ /ha	Aplicar como pulverização de alto volume em 1000 – 3000 ℓ de água/ha, dependendo do tamanho da árvore. Iniciar a pulverização em meados de Novembro e continuar até Janeiro/ Fevereiro fazendo intervalos de 7 a 10 dias entre cada pulverização.
ÁRVORES DE PRUNÓIDEAS Damascos, Ameixas, Pêssegos	500 mℓ/100 ℓ de água até a um máximo de 8 ℓ /ha	Aplicar como pulverização de cobertura média a partir da primeira semana de Novembro em 1000-3000 ℓ de água/ha. Aplicar 6 pulverizações em intervalos de 14 dias entre cada pulverização.
FRUTA SUB-TROPICAL: Mangas, Goiabas, Litchis, Macadâmias	500 mℓ/100 ℓ de água até a um máximo de 15 ℓ /ha	Aplicar durante a floração como pulverização de cobertura média em 1000-3000 ℓ de água/ha. Aplicar uma pulverização complementar 14 dias depois.
BATATAS	500 mℓ/100 ℓ de água até a um máximo de 4 ℓ /ha. Aplicação aérea: 4 ℓ /ha	Aplicar a primeira pulverização na formação dos tubérculos. Repetir em intervalos de 14 a 20 dias.
VEGETAIS E GRANDES CULTURAS: Couves, pepinos, aipo, ervilhas, pimentos, cebolas, alface, tomates, milho	500 mℓ/100 ℓ de água até a um máximo de 4 ℓ /ha	Aplicar a partir da frutificação ou formação da cabeça e repetir em intervalos de 7 a 10 dias. Aplicar em 300-500 ℓ de água/ha.
AMENDOINS	500 mℓ/100 ℓ de água até a um máximo de 3 ℓ /ha	Aplicar em 300-500 ℓ de água/ha. Aplicação aérea: 30-40 ℓ de água/ha. Aplicar no princípio da estação quando as plantas têm folhas suficientes para absorver a pulverização.
PIMENTÃO DOCE/ COLORAU	500 mℓ/100 ℓ de água até a um máximo de 3 ℓ /ha	Aplicar quando surgem os primeiros sintomas de deficiência. Repetir se necessário. Aplicar em 300-500 ℓ de água/ha. Aplicação aérea: 30-40 ℓ de água/ha.

NOTA: O VOLUME DE PULVERIZAÇÃO SERÁ DETERMINADO PELA PRÓPRIA PLANTA OU SEU TAMANHO. A DOSAGEM ESTÁ DEPENDENTE DA INTENSIDADE DA DEFICIÊNCIA.

IMPORTANTE: ANTES DE PROCEDER À APLICAÇÃO DE DOUBLE MAX, CONSULTE UM AGRÓNOMO QUALIFICADO OU UM ASSESSOR AGRÍCOLA SOBRE A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

Bladbuff® é uma marca registada da AECL Limited (Nulandis® uma divisão da AECL Limited)