# DOUBLE MAX

Um complexo de cálcio e magnésio, líquido e orgânico, para correcção de sintomas de deficiência das culturas, conforme listado.

**Substâncias Activas**

| | | |
|---|---|---|
| Cálcio | (Ca) | 80 g / ℓ |
| Magnésio | (Mg) | 15 g / ℓ |
| Boro | (B) | 6.3 g / ℓ |

**Fabricado por:**
**Nulandis**

14 Field Road (cnr Bird Street),
Lilianton , 1459
South Africa
info@nulandis.com
TELEPHONE: +27 11 823800
FAX: +27 11 8261727

**Importado por:**
**Aeci Latam Produtos Quimicos Ltda**

Av. das Americas, 8445,
sala 409- Barra da Tijuca-RJ
CEP 22.793-081
Telefone: 21-24311361
CNPJ: 18920.914/0001-36
EI – RJ-78948-8

**DOUBLE MAX** é um complexo de cálcio e magnésio, líquido e orgânico, para utilização como nutriente foliar em várias culturas com o fim de evitar ou corrigir deficiências de cálcio e magnésio.

**INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO.**

- **DOUBLE MAX** é compatível com a maioria dos pesticidas e alimentação foliar frequentemente utilizados, à excepção de alimentação foliar com um alto teor fosfórico.
- Não misturar **DOUBLE MAX** com matéria alcalina como sejam a Calda Sulfocálcica e a Calda Bordalesa.
- Quando se utilizam sistemas de irrigação por aspersão, deve evitar-se a irrigação programada logo a seguir à aplicação. Em pomares equipados com sistemas de micro irrigação, os depósitos da pulverização não devem ser afectados pela irrigação.
- Utilizar a concentração mais baixa para manutenção e a concentração mais alta para absorção suficiente.
- Não utilizar em combinação com **BLADBUFF 7** ou **BLADBUFF 12**

| CULTURA | TAXA DE APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| UVAS | 500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 5 l/ha | Aplicar a primeira pulverização quando a fruta atingir o tamanho de ervilha. Repetir 3 vezes em intervalos de 14 dias. |
| CITRINOS | 500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 10 ℓ /ha | Aplicar como pulverização de cobertura média em 1000 – 3000 ℓ de água/ha. A primeira pulverização é feita na queda total das pétalas. Repetir 1-2 vezes se necessário. |
| ÁRVORES DE POMÓIDEAS: Maçãs, Peras | 500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 5 ℓ /ha | Aplicar como pulverização de alto volume em 1000 – 3000 ℓ de água/ha, dependendo do tamanho da árvore. Iniciar a pulverização em |

| | | |
|---|---|---|
| | | meados de Novembro e continuar até Janeiro/ Fevereiro fazendo intervalos de 7 a 10 dias entre cada pulverização. |
| ÁRVORES DE PRUNÓIDEAS<br>Damascos, Ameixas, Pêssegos | 500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 8 ℓ /ha | Aplicar como pulverização de cobertura média a partir da primeira semana de Novembro em 1000-3000 ℓ de água/ha. Aplicar 6 pulverizações em intervalos de 14 dias entre cada pulverização. |
| FRUTA SUB-TROPICAL:<br>Mangas, Goiabas, Litchis, Macadâmias | 500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 15 ℓ /ha | Aplicar durante a floração como pulverização de cobertura média em 1000-3000 ℓ de água/ha. Aplicar uma pulverização complementar 14 dias depois. |
| BATATAS | 500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 4 ℓ /ha.<br>Aplicação aérea: 4 ℓ /ha | Aplicar a primeira pulverização na formação dos tubérculos. Repetir em intervalos de 14 a 20 dias. |
| VEGETAIS E GRANDES CULTURAS:<br>Couves, pepinos, aipo, ervilhas, pimentos, cebolas, alface, tomates, milho | 500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 4 ℓ /ha | Aplicar a partir da frutificação ou formação da cabeça e repetir em intervalos de 7 a 10 dias. Aplicar em 300-500 ℓ de água/ha. |
| AMENDOINS | 500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 3 ℓ /ha | Aplicar em 300-500 ℓ de água/ha.<br>Aplicação aérea: 30-40 ℓ de água/ha.<br>Aplicar no princípio da estação quando as plantas têm folhas suficientes para absorver a pulverização. |
| PIMENTÃO DOCE/ COLORAU | 500 ml/100 ℓ de água até a um máximo de 3 ℓ /ha | Aplicar quando surgem os primeiros sintomas de deficiência. Repetir se necessário.<br>Aplicar em 300-500 ℓ de água/ha.<br><br>Aplicação aérea: 30-40 ℓ de água/ha. |

**NOTA: O VOLUME DE PULVERIZAÇÃO SERÁ DETERMINADO PELA PRÓPRIA PLANTA OU SEU TAMANHO.**
**A DOSAGEM ESTÁ DEPENDENTE DA INTENSIDADE DA DEFICIÊNCIA.**

**IMPORTANTE: ANTES DE PROCEDER À APLICAÇÃO DE DOUBLE MAX, CONSULTE UM AGRÓNOMO QUALIFICADO OU UM ASSESSOR AGRÍCOLA SOBRE A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.**

BLADBUFF® é uma marca registada da AECI Limited