

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

FERROMAX

Um complexo de ferro orgânico líquido para utilização como nutriente foliar em várias culturas para prevenir ou corrigir carências.

Nº do registo: DSV – 217

COMPOSIÇÃO:

Ferro (Fe)5.0 % m/v

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Volume líquido:

Agente:

AECI Mozambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
TEL: +263 712 613 068



Fabricante:

Nulandis® uma divisão da AECI Ltd
14 Field Road
Boksburg, República da África do Sul
TEL: +27 (11) 823 8000



Nulandis® é uma marca registada da AECI Limited (Nulandis® uma divisão da AECI Limited)



UN No.: Not Regulated / Não Regulado



Causa irritação nos olhos e na pele.

PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.

FERROMAX

Um complexo de ferro orgânico líquido para utilização como nutriente foliar em várias culturas para prevenir ou corrigir carências.

COMPOSIÇÃO:

Ferro (Fe)..... 5.0 %m/v

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Usar apenas como indicado

FERROMAX é compatível com os mais frequentemente utilizados pesticidas e nutrientes foliares. Não misturar **FERROMAX** com substâncias altamente alcalinas como sejam os preparados de Calda Sulfocálcica ou Calda Bordalesa. Onde são usados sistemas de irrigação por aspersão, evitar programar a irrigação logo a seguir à aplicação. Em pomares equipados com sistemas de micro irrigação, os depósitos de pulverização não devem ser afetados pela irrigação. Utilizar a concentração mais baixa para manutenção, e a concentração mais alta para suficiente absorção.

APLICAÇÃO FOLIAR:

CULTURA	DOSAGEM/100ℓ DE ÁGUA	DETALHES DE APLICAÇÃO
Citrinos	120 - 180 ml até a um máximo de 2,5 - 9 ℓ/ha	Aplicar duas pulverizações em intervalos de 7 a 14 dias. Aplicar em 2 000 - 5 000 ℓ de água /ha.
Frutos de pevide, Frutos de caroço	120 - 180 ml até a um máximo de 2,5 - 9 ℓ/ha	Aplicar três pulverizações com intervalos de 7 a 14 dias no desenvolvimento das primeiras folhas. Aplicar em 2 000 - 5 000 ℓ de água /ha.
Plantas ornamentais	120 - 180 ml até a um máximo de 1,2 - 2,5 ℓ/ha	Pulverizar semanalmente até os sintomas desaparecerem nas folhas mais novas. Aplicar em 1 000 - 1 500 ℓ de água /ha.
Videiras	120 - 180 ml até a um máximo de 1,2 - 2,5 ℓ/ha	Pulverizar semanalmente até os sintomas desaparecerem. Não pulverizar durante a floração. Aplicar em 1 000 - 1500 ℓ de água /ha.
Grandes culturas e leguminosas: Cereais, ervilhas, canola, milho, tomates, batatas	800 ml até a um máximo de 3,0 - 4,0 ℓ /ha	Pulverizar no início da estação de crescimento quando a cultura ainda tem uma superfície foliar suficiente para absorver a pulverização. Aplicar em 300 - 500 ℓ de água /ha.
Cana-de-açúcar	500 ml até a um máximo de 4,0 - 6,0 ℓ /ha	Aplicar em 300 - 500 ℓ de água /ha. Aplicação aérea: 30 - 40 ℓ de água /ha. Pulverizar no início da estação de crescimento quando a cultura ainda tem uma superfície foliar suficiente para absorver a pulverização.

APLICAÇÃO NO SOLO:

MÉTODO	TAXA DE DOSAGEM	APLICAÇÃO
HUMEDECIMENTO 1.Tratamento geral	1,0 - 2,0 ℓ / 100 ℓ de água	Aplicar a uma taxa de 100 ℓ de solução por 100 m² (1 ℓ/m²). Aplicar água suficiente para remover os resíduos das folhas e enxaguar a solução para a zona das raízes. Repetir as pulverizações nas plantas que são suscetíveis a insuficiência de ferro como sejam as Azáleas, Camélias, Gardénia, Hortênsias, Rododendros e Rosas.
2.Plantas em vaso	3 - 5 ml por 10 ℓ de água	Aplicar em intervalos de 14 dias.
INCORPORAÇÃO 1.Buracos de plantação	50 - 130 ml por m³ de solo	Incorporar com o solo na altura da plantação de árvores de fruto e outras árvores, onde se sabe que o solo tem insuficiência de ferro.
2.Terra para vasos	30 - 50 ml por m³ de solo	

FERTIRRIGAÇÃO (via irrigação)	250 - 650 ml por 1 000 ℓ de água	Aplicar em intervalos de 7 a 14 dias. Não exceder 6-8 ℓ de FERROMAX por hectare por aplicação. No caso dos sistemas de irrigação por aspersão, injetar no início do ciclo de irrigação.
---	----------------------------------	--

IMPORTANTE: ANTES DE APLICAR FERROMAX CONSULTE UM AGRÔNOMO OU ASSESSOR AGRÍCOLA QUALIFICADOS SOBRE A NECESSIDADE DA SUA UTILIZAÇÃO. OS VOLUMES DE PULVERIZAÇÃO OU DOSAGEM A SER APLICADA SERÃO DETERMINADOS PELA PRÓPRIA ÁRVORE E TAMANHO DA PLANTA. A DOSAGEM DEPENDE DA MAGNITUDE DA INSUFICIÊNCIA.