

FLO-BOR



Nº do registo: DSV – 303

Solução de Poliborato

FLO-BOR é uma solução que contém boro para ser usada como pulverização foliar ou como tratamento do solo.

COMPOSIÇÃO:

Boro (B)12.9 %m/v

Agente:

AECI® Moçambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
T +258 84/82 274 7440

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

GRUPO 2 FERTILIZANTE

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Volume líquido:

Fabricante:

AECI Plant Health uma divisão da **AECI® Ltd**
14 Field Road,
Boksburg
Republica da África do Sul
T +27 (11) 823 8000

UN No. Not Regulated / Não Regulado

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



P7502 MOZ06/23 V2

Provoca queimaduras graves na pele e danos oculares.
Pode prejudicar a fertilidade. Suspeita de danificar o nascituro.

PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO
ANEXADO.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO

APLICAÇÃO FOLIAR:

Assegurar que a água utilizada para pulverização é suficiente para providenciar a cobertura total da superfície da planta. Não exceder a concentração de 0,75% v.v. em culturas arvenses e 0,3% v.v. em flores e plantas ornamentais (0,15% v.v. em Gladiolos).

APLICAÇÃO NO SOLO:

Aplicar em água suficiente para se obter uma cobertura uniforme. Para óptima absorção pela planta, o boro deve deslocar-se até à zona radicular através da pluviosidade, incorporação ou irrigação. Não permitir que FLO-BOR entre em contacto directo com as sementes.

COMPATIBILIDADE:

FLO-BOR é compatível com a maioria dos fertilizantes foliares mais frequentemente utilizados. No entanto, é recomendado levar a cabo um teste de compatibilidade numa pequena área e observar a área tratada durante 3 dias antes de se iniciarem as pulverizações comerciais.

FLO-BOR não é compatível com Sulfato de zinco, Sulfato de manganês, Calda sulfocálcica ou formulações de óleo miscíveis.

TABELA DE APLICAÇÃO:

CULTURA	DOSAGEM	MÉTODO DE APLICAÇÃO
ABACATES	50 – 150 ml/100 ℓ de água máximo 2,5 ℓ / ha	Aplicar como pulverização de cobertura total para manter os níveis de boro. Repetir após a colheita.
ALGODÃO	375 – 750 ml/ha	Aplicar como pulverização de cobertura total durante o período da floração, onde for identificada deficiência de boro.
BATATAS, AMENDOINS E OUTRAS CULTURAS	350 ml/ha	Aplicar 4 - 5 vezes por estação em intervalos de 3 semanas através de aplicação aérea ou por tractor. Durante os anos seguintes, devem ser aplicados apenas 2 tratamentos por estação.
CEBOLAS	750 ml/ha	Aplicar o primeiro tratamento 3 semanas após as plantas estarem estabelecidas com repetição 3 semanas mais tarde.
CITRINOS	Máximo de 50 ml por árvore	Espalhar uniformemente na zona de gotejamento das árvores. Não repetir num prazo de 3 anos após o tratamento e não tratar árvores jovens.
	200 ml/100 ℓ de água	Não aplicar mais do que uma vez por ano como pulverização de cobertura total. Usar em 1000 - 2000 ℓ de água /ha.
FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS	100-150 ml/100 ℓ de água	Aplicar 2 - 3 pulverizações mensalmente, com início no período do desenvolvimento das plantas.

CULTURA	DOSAGEM	MÉTODO DE APLICAÇÃO
GIRASSÓIS, COUVE-FLOR, OUTRAS CRUCÍFERAS E TOMATES	750 ml/ha	Aplicar como pulverização foliar de cobertura total, quando necessário. Repetir após formação de novas folhas. Se necessário, aplicar uma terceira pulverização.
LUZERNA 0 - 15% argila 16 - 30% argila + 31% argila	500 ml/ha 1 000 ml/ha 1 500 ml/ha	A) Tratamento de Manutenção: Aplicar como tratamento de pulverização total, 10 dias após o corte.
0 - 15% argila 16 - 30% argila + 31% argila	5 l/ha 6 l/ha 7,75 l/ha máximo (incorporado no solo a uma profundidade de 10-15 cm)	B) Tratamento Corretivo: Aplicar uma única pulverização como aplicação total imediatamente após o corte quando a análise dos 15 cm superiores da planta indicar um nível inferior a 20 mg de boro/kg (20 ppm) antes da floração. Os níveis de boro podem ser então reanalisados e ajustados se necessário, com base na análise do solo.
MAÇÃS, PERAS, DAMASCOS, AMEIXAS, PÊSSEGOS, CEREJAS	100 ml/100 l de água ou 2 l/ha	Aplicar 2 tratamentos: a) A 30% da floração b) Pós-colheita no Outono
MACADÂMIAS	50 - 150 ml/100 l de água/ha	Aplicar como pulverização de cobertura total para manter os níveis de boro.
TABACO	350 - 750 ml/ha	Aplicar 4 - 5 vezes por estação com intervalos de 3 semanas. Aplicar como pulverização aérea ou por trator.
UVAS	100 ml/100 l de água/ha 200 ml/100 l de água/ha	Aplicar 2 tratamentos: a) Mesmo antes do período da floração b) Tratamento pós-colheita
APLICAÇÃO NO SOLO PRÉ-PLANTA		
GIRASSÓIS 0-15% argila 16-30% argila +31% argila	5 l/ha 6 l/ha 7,75 l/ha máximo (incorporado no solo a uma profundidade de 10-15 cm)	Em áreas para cultivo de girassóis, pulverizar o solo uniformemente antes da preparação final. Quando a análise das folhas da cultura anterior permitir, pode ser omitido o tratamento.
MILHO 0-15% argila 16-30% argila +31% argila	5 l/ha 6 l/ha 7,75 l/ha máximo (incorporado no solo a uma profundidade de 10-15 cm)	Pulverizar uniformemente sobre o solo antes da preparação final para a plantação, excepto quando a análise das folhas da cultura anterior indicar não ser necessário o tratamento.

IMPORTANTE: ANTES DE PROCEDER À APLICAÇÃO DE FLO-BOR, CONSULTAR UM AGRÓNOMO QUALIFICADO OU UM ASSESSOR AGRÍCOLA SOBRE A SUA UTILIZAÇÃO.