

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

FRUITBOOST FASE 2

Um complexo nutritivo orgânico líquido para utilização como meio de pulverização foliar em árvores frutíferas na fase de frutificação e desenvolvimento para prevenir ou corrigir insuficiências.

Nº do registo: DSV – 302

Composição:

Cálcio (Ca)	2.47 % m/v
Potássio (K)	6.29 %m/v
Zinco (Zn)	0.49 %m/v
Boro (B)	0.183 %m/v
(Contém algas)	
Gravidade Específica: 1.235 a 20°C	

CALCIMAX é uma marca registada da Nulandis® uma divisão da AECI Limited

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Volume líquido:

Agente:

AECI Mozambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
TEL: +263 712 613 068



Fabricante:

Nulandis® uma divisão da AECI Ltd
14 Field Road
Boksburg, Republica da África do Sul
TEL: +27 (11) 823 8000



Nulandis® é uma marca registada da AECI Limited (Nulandis® uma divisão da AECI Limited)

UN No.: Not Regulated / Não Regulado

Não Perigoso



PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.

FRUITBOOST FASE 2

Um complexo nutritivo orgânico líquido para utilização como meio de pulverização foliar em árvores frutíferas na fase de frutificação e desenvolvimento para prevenir ou corrigir insuficiências.

Composição:

Cálcio (Ca)2.47 % m/v
Potássio (K)6.29 %m/v
Zinco (Zn)0.49 %m/v
Boro (B)0.183 %m/v
(Contém algas)
Gravidade Específica: 1.235 a 20°C

TABELA DE APLICAÇÃO:

FRUITBOOST FASE 2 é especialmente concebido para ser aplicado como pulverização foliar em árvores frutíferas durante a fase frutificação e desenvolvimento, salvo indicações em contrário.

CULTURA	TAXA DE DOSAGEM	DETALHES DE APLICAÇÃO
Abacates Líchias Macadâmias Mangas	500 ml / 100 l de água até a um máximo de10 l/ha	Aplicar três vezes durante a frutificação e desenvolvimento num mínimo de 1 000 l de água.
Nectarinas Ameixas Pêssegos Damascos	500 ml a 1 l / 100 l de água até a um máximo de 5 l/ha	Aplicar três vezes durante a frutificação e desenvolvimento.
Citrinos	500 ml / 100 de água até a um máximo de10 l/ha	Aplicar duas vezes durante a frutificação e desenvolvimento num mínimo de 1 000 l de água.
Uvas	350 ml a 500ml / 100 l de água até a um máximo de 10 l/ha	Aplicar duas vezes durante a frutificação e desenvolvimento.
Maças Peras	500 ml a 1 l / 100 l de água até a um máximo de 5 l/ha	Aplicar três vezes durante a frutificação e desenvolvimento. Alternar as aplicações de Fruitboost Fase 2 com pulverizações de Calcimax .

CALCIMAX é uma marca registada da Nulandis® uma divisão da AECI Limited