

K-MAX

COMPLEXO DE POTÁSSIO ORGÂNICO LÍQUIDO

Um complexo de potássio orgânico líquido para suplementar os níveis de potássio em culturas com elevadas necessidades de potássio.

SUBSTÂNCIA ACTIVA:

Potássio (K)91 g/kg (115 g/l)

Fabricado por:

Nulandis

14 Field Road (cnr Bird Street),

Lilianton , 1459

South Africa

info@nulandis.com

TELEPHONE: +27 11 823800

FAX: +27 11 8261727

Importado por:

Aeci Latam Produtos Quimicos Ltda

Av. das Americas, 8445,

sala 409- Barra da Tijuca-RJ

CEP 22.793-081

Telefone: 21-24311361

CNPJ: 18920.914/0001-36

EI – RJ-78948-8

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO

K-MAX é compatível com os pesticidas e alimentação foliar mais frequentemente utilizados. Não misturar **K-MAX** com material altamente alcalino como sejam a Calda Sulfocálcica e a Calda Bordalesa. Quando se utilizam sistemas de irrigação por aspersão, deve evitar-se a irrigação programada logo a seguir à aplicação. Em pomares equipados com sistemas de micro irrigação, os depósitos da pulverização não devem ser afectados pela irrigação. Utilizar a concentração mais baixa para manutenção e a concentração mais alta para absorção suficiente. Aplicar **K-MAX** como pulverização foliar onde uma fonte neutra de potássio, de acção rápida, é necessária para suplementar as necessidades de potássio.

TABELA DE APLICAÇÃO:

CULTURA	DOSAGEM/ha OU COMO INDICADO	MÉTODO DE APLICAÇÃO
CULTURAS FRUTÍCOLAS		
MAÇÃS, PERAS	1 - 2 l/100 l de água até a um máximo de 10 l/ha	Aplicar 2-3 pulverizações como tratamento suplementar de potássio após a frutificação, crescimento da fruta e repetir em intervalos de 14 dias. Aplicar num mínimo de 1 000 - 2 000 l de água/ha.
PÊSSEGOS, AMEIXAS, NECTARINAS, DAMASCOS	2 l/100 l de água até a um máximo de 10 l/ha	Aplicar 2-3 pulverizações após a frutificação, durante o crescimento da fruta, e repetir em intervalos de 7 a 14 dias. Aplicar num mínimo de 1 000 - 2 000 l de água/ha.
CITRINOS	1-2 l/100 l de água até a um máximo de 10 l/ha	Aplicar como pulverização de alto volume num mínimo de 1000 - 3000 l de água/ha. Repetir 1 ou 2 vezes, se necessário.
UVAS	2 - 4 l/100 l de água até a um máximo de 10 l/ha	Aplicar quando os bagos têm o tamanho de uma ervilha e repetir 21 dias mais tarde. Aplicar num mínimo de 1 000 l de água/ha.
GRANDES CULTURAS		
CEREAIS, ERVILHAS, CANOLA, MILHO	1 - 2 l/100 l de água até a um máximo de 10 l/ha	Aplicar 4 pulverizações no período de pós floração como tratamento suplementar de potássio em intervalos de 7 a 14 dias. Aplicar num mínimo de 500 l de água/ha.
VEGETAIS: TOMATES, BERINGELAS, PIMENTOS, CUCURBITÁCEAS, ALFACES	0,5 - 1 l/100 l de água até a um máximo de 5 l/ha	Aplicar 4-5 pulverizações imediatamente após a formação da fruta e continuar com o tratamento semanalmente até 2 semanas antes da colheita. Aplicar num mínimo de 500 l de água/ha. Para alface, aplicar regularmente durante o ciclo vegetativo.

BATATAS	1 - 2 l/100 l de água até a um máximo de 10 l/ha	Aplicar na formação dos tubérculos e repetir em intervalos de 7 a 14 dias. Aplicar num mínimo de 500 l de água/ha.
TABACO	4 l/100 l de água até a um máximo de 30 l/ha	Aplicar 2-3 pulverizações depois da poda num mínimo de 400 l de água/ha.
RELVA	0,5 - 1 l/100 l de água até a um máximo de 15 l/ha	Aplicar 2-3 pulverizações quinzenalmente.
PLANTAS ORNAMENTAIS	2 l / 100 l de água até a um máximo de 10 l/ha	Aplicar 2-3 pulverizações por ciclo vegetativo. Assegurar uma boa humedificação das plantas.
PERA ABACATE, MANGAS, LITCHIS, MACADÂMIAS	4 l/100 l de água até a um máximo de 20 l/ha	Aplicar 1-2 pulverizações. Aplicar a primeira pulverização nas flores e repetir durante o Verão. Aplicar num mínimo de 1 000-2 000 l de água/ha.

NOTA:

QUANTIDADES EXCESSIVAS DE POTÁSSIO NAS MACIEIRAS PODEM GERAR FRUTA DE MÁ QUALIDADE DEVIDO AO DESEQUILÍBRIO DOS NUTRIENTES. O VOLUME E DOSE DE PULVERIZAÇÃO APLICADOS SERÃO DETERMINADOS PELO TAMANHO DA PRÓPRIA ÁRVORE OU PLANTA. A DOSAGEM DEPENDE DA INTENSIDADE DA DEFICIÊNCIA.

IMPORTANTE:

ANTES DE PROCEDER À APLICAÇÃO DE K-MAX, CONSULTE UM AGRÓNOMO QUALIFICADO OU UM ASSESSOR AGRÍCOLA SOBRE A UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS.