

K-Max®

Concime minerale semplice

Soluzione di sali potassici B.T.C.



1 Kg

CONCIME MINERALE SEMPLICE SOLUZIONE DI SALI POTASSICI B.T.C

COMPOSIZIONE:

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 11 %

EUH210 SCHEDA DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Conservare il prodotto a temperatura compresa fra + 5 e + 35°C.

In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto, assorbire con materiali inerti e smaltire secondo le norme locali.

Non superare le dosi appropriate.

Fabbricante: **AGROSERV di Pugliese Emilia**

Via Garibaldi 89 - 15026 Oviglio (AL) - Tel.: +39 0131 1740449

Partita n. vedi corpo della confezione

Peso netto: **1 Kg**

CARATTERISTICHE:

K-Max è un concime potassico fluido per trattamenti fogliari preparato con materie prime ad alto grado di purezza che conferiscono al prodotto un elevato assorbimento da parte delle piante. Il suo utilizzo regolare, secondo le modalità indicate, consente di ottenere importanti vantaggi produttivi. K-Max migliora le caratteristiche qualitative delle produzioni, in particolare la consistenza, il colore, la conservabilità e il contenuto in zuccheri. Migliora la consistenza dei tessuti aumentando la pezzatura dei frutti e la produttività. Determina un migliore equilibrio tra fase vegetativa e riproduttiva pur contenendo gli sviluppi vegetativi eccessivi.

Dosi e modalità di impiego:

COLTURA	DOSE kg/ha	NOTE
POMACEE Melo, Pero	3 - 5	Effettuare un trattamento in post-allegagione uno all'ingrossamento dei frutti e poi intervenire ogni 14 gg.
DRUPACEE Albicocco, Pesco, Susino, Ciliegio	3 - 5	Effettuare un trattamento dopo l'allegagione e uno all'ingrossamento dei frutti. Ripetere a intervalli di 14 gg.
AGRUMI	3 - 6	1-2 trattamenti con almeno 1000-2000 l/ha di acqua.
VITE	4 - 6	Applicare in pre-chiusura grappolo e ripetere dopo 21 gg.
CEREALI Frumento, Orzo, Mais	2	Eseguire 4 applicazioni dopo la fioritura a intervalli di 7-14 gg.
PATATA	3 - 4	Applicare al rigonfiamento del tubero e ripetere 2-3 interventi ogni 7-14 gg.
TABACCO	5	Eseguire 2-3 applicazioni dopo la maturazione.
ORTAGGI	2 - 3	4-5 Applicazioni dalla formazione del frutto a intervalli di 7gg fino a 2 settimane prima della raccolta.
Floreali e Ornamentali	2 - 3	Eseguire 2-3 applicazioni durante il ciclo vegetativo bagnando bene.

IMPORTANTE:

AGITARE ED OMOGENEIZZARE PRIMA DELL'USO.

Quantità eccessive di potassio nelle mele possono portare a una scarsa qualità del frutto se non vengono rispettati i giusti rapporti nutrizionali. K-Max è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci e fertilizzanti comunemente usati, ad eccezione di nutrienti fogliari ad alto contenuto di fosforo. Non miscelare K-Max con prodotti altamente alcalini come Miscela Solfocalcica o Poltiglia Bordolessa.

Prodotto originale:  **NULANDIS** South Africa