



good chemistry

K-MAX



Nº do registo: DSV -215

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

Um complexo de potássio líquido para
suplementar os níveis de potássio em culturas
com elevadas necessidades de potássio.

GRUPO 2 FERTILIZANTE

COMPOSIÇÃO:

Potássio (K)9.1% m/m (11.5 % m/v)

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Volume líquido:

Agente:

AECI® Moçambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
T +258 84/82 274 7440

Fabricante:

AECI Plant Health uma divisão da AECI® Ltd
14 Field Road,
Boksburg
Republica da África do Sul
T +27 (11) 823 8000

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

UN No. Not Regulated / Não Regulado

PXXXX MOZ06/23 V2

Não Perigoso

**PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.**



INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO

K-MAX é compatível com os pesticidas e alimentação foliar mais frequentemente utilizados. Não misturar K-MAX com material altamente alcalino como sejam a Calda Sulfocálcica e a Calda Bordalesa. Quando se utilizam sistemas de irrigação por aspersão, deve evitar-se a irrigação programada logo a seguir à aplicação. Em pomares equipados com sistemas de micro irrigação, os depósitos da pulverização não devem ser afectados pela irrigação. Utilizar a concentração mais baixa para manutenção e a concentração mais alta para absorção suficiente. Aplicar K-MAX como pulverização foliar onde uma fonte neutra de potássio, de acção rápida, é necessária para suplementar as necessidades de potássio.

TABELA DE APLICAÇÃO:

CULTURA	DOSAGEM/ha OU COMO INDICADO	MÉTODO DE APLICAÇÃO
CULTURAS FRUTÍCOLAS		
MAÇÃS, PERAS	1 - 2 <i>ℓ</i> /100 <i>ℓ</i> de água até a um máximo de 10 <i>ℓ</i> /ha	Aplicar 2-3 pulverizações como tratamento suplementar de potássio após a frutificação, crescimento da fruta e repetir em intervalos de 14 dias. Aplicar num mínimo de 1 000 - 2 000 <i>ℓ</i> de água/ha.
PÊSSEGOS, AMEIXAS, NECTARINAS, DAMASCOS	2 <i>ℓ</i> /100 <i>ℓ</i> de água até a um máximo de 10 <i>ℓ</i> /ha	Aplicar 2-3 pulverizações após a frutificação, durante o crescimento da fruta, e repetir em intervalos de 7 a 14 dias. Aplicar num mínimo de 1 000 - 2 000 <i>ℓ</i> de água/ha.
ITRINOS	1-2 <i>ℓ</i> /100 <i>ℓ</i> de água até a um máximo de 10 <i>ℓ</i> /ha	Aplicar como pulverização de alto volume num mínimo de 1000 - 3000 <i>ℓ</i> de água/ha. Repetir 1 ou 2 vezes, se necessário.
UVAS	2 - 4 <i>ℓ</i> /100 <i>ℓ</i> de água até a um máximo de 10 <i>ℓ</i> /ha	Aplicar quando os bagos têm o tamanho de uma ervilha e repetir 21 dias mais tarde. Aplicar num mínimo de 1 000 <i>ℓ</i> de água/ha.
GRANDES CULTURAS		
CEREAIS, ERVILHAS, CANOLA, MILHO	1 - 2 <i>ℓ</i> /100 <i>ℓ</i> de água até a um máximo de 10 <i>ℓ</i> /ha	Aplicar 4 pulverizações no período de pós floração como tratamento suplementar de potássio em intervalos de 7 a 14 dias. Aplicar num mínimo de 500 <i>ℓ</i> de água/ha.
VEGETAIS: TOMATES, BERINGELAS, PIMENTOS, CUCURBITÁCEAS, ALFACES	0,5 - 1 <i>ℓ</i> /100 <i>ℓ</i> de água até a um máximo de 5 <i>ℓ</i> /ha	Aplicar 4-5 pulverizações imediatamente após a formação da fruta e continuar com o tratamento semanalmente até 2 semanas antes da colheita. Aplicar num mínimo de 500 <i>ℓ</i> de água/ha. Para alface, aplicar regularmente durante o ciclo vegetativo.

NOTA: QUANTIDADES EXCESSIVAS DE POTÁSSIO NAS MACIEIRAS PODEM GERAR FRUTA DE MÁ QUALIDADE DEVIDO AO DESEQUILÍBRIO DOS NUTRIENTES. O VOLUME E DOSE DE PULVERIZAÇÃO APLICADOS SERÃO DETERMINADOS PELO TAMANHO DA PRÓPRIA ÁRVORE OU PLANTA. A DOSAGEM DEPENDE DA INTENSIDADE DA DEFICIÊNCIA.

IMPORTANTE: ANTES DE PROCEDER À APLICAÇÃO DE K-MAX, CONSULTE UM AGRÓNOMO QUALIFICADO OU UM ASSESSOR AGRÍCOLA SOBRE A UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS.