

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

MAXI-BOOST®

PREPARAÇÃO LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES

Nº do registo: DSV –

SUBSTÂNCIA ACTIVAS:

Magnésio (Mg)	1.13 %m/v	Boro (B)	0.29 %m/v
Ferro* (Fe)	0.57 %m/v	Molibdénio (Mo)	0.005 %m/v
Manganês* (Mn)	0.28 % m/v	Enxofre (S)	1.46 %m/v
Zinco* (Zn)	0.17 %m/v	αAuxinas	8.8x10 ⁻⁴ %m/v
Cobre* (Cu)	0.29 %m/v	αCitoquininas	2.5x10 ⁻⁶ %m/v

* Quelados (EDTA)

α **MAXI-BOOST** contém 80% de Kelpak dos Kelp Products (Pty) Ltd

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Volume líquido:

Agente:

AECI Mozambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
TEL: +263 712 613 068




Fabricante:

Nulandis® uma divisão da AECI Ltd
14 Field Road
Boksburg, República da África do Sul
TEL: +27 (11) 823 8000



Nulandis® é uma marca registada da AECI Limited (Nulandis® uma divisão da AECI Limited)



UN No.: Not Regulated / Não Regulado

Não Perigoso

PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.

MAXI-BOOST®

PREPARAÇÃO LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES

SUBSTÂNCIAS ATIVAS:

Magnésio (Mg)	1.13 %m/v
Ferro* (Fe)	0.57 %m/v
Manganês* (Mn)	0.28 % m/v
Zinco* (Zn)	0.17 %m/v
Cobre* (Cu)	0.29 %m/v
Boro (B)	0.29 %m/v
Molibdênio (Mo)	0.005%m/v
Enxofre (S)	1.46 %m/v
αAuxinas	8.8x10 ⁻⁴ %m/v
αCitoquininas	2.5x10 ⁻⁶ %m/v

* Quelados (EDTA)

α MAXI-BOOST contém 80% de Kelpak dos Kelp Products (Pty) Ltd

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: UTILIZAR A PENAS COMO INDICADO

MAXI-BOOST é um fertilizante líquido de micronutrientes contendo auxinas e citoquininas de extracto de *Ecklonia maxima* recomendado para utilização como suplemento a programas normais de fertilização:

- para corrigir e prevenir a ocorrência de deficiências de micronutrientes
- manter níveis adequados de micronutrientes na planta
- estimular o desenvolvimento e crescimento das raízes
- otimizar o crescimento da fruta sob determinadas condições

APLICAÇÃO FOLIAR:

Utilizar como aplicação de terreno num mínimo de 500 l de mistura de pulverização ou como aplicação aérea em 30l de mistura de pulverização por hectare.

APLICAÇÃO NO SOLO:

Aplicar como “encharcamento” na transplantação. Agitar muito bem antes de usar e assegurar uma agitação constante durante a preparação e aplicação. Não usar em filtros de rede inferiores a 50, no equipamento de pulverização, quando aplicar **MAXI-BOOST**.

TABELA DE APLICAÇÃO:

CULTURA	TAXA	MÉTODO DE APLICAÇÃO
Cevada, Aveia	2 l/ha	Aplicar como pulverização única na fase de crescimento 4-7.
Amendoins	2 l/ha	Aplicar a primeira pulverização 2 a 3 semanas após a germinação e repetir 3 a 4 semanas mais tarde.
Tremoços	2 l/ha	Aplicar uma única pulverização 2 a 7 semanas após a germinação.
Milho	1 l/ha, ou 2 l/ha	Aplicar como pulverização de fileira na fase de 3 a 5 folhas. Aplicar como pulverização total na fase de 3 a 5 folhas com o adjuvante Bio-Film (Reg. Nº. L3684, Lei Nº. 36 de 1947) ou Biodew (Reg. Nº. L8120, Lei Nº. 36 de 1947).
Plantas Ornamentais, Flores	200 ml/100 l de água	Aplicar como pulverização de cobertura total com intervalos de 3 semanas.
Batatas	4 l/ha 2 l/ha	Aplicar a primeira pulverização 28 dias após a germinação. Repetir a aplicação 10 a 14 dias mais tarde, antes da floração.
Feijão de soja	4 l/ha 2 l/ha	Aplicar a primeira pulverização à terceira fase de folhas trifoliadas. Repetir a aplicação 10 a 14 dias mais tarde.
Tomates, Pimentos	1 ml / 250 ml de água/planta 2 l/ha	Aplicar como “encharcamento” na transplantação. Repetir a aplicação em intervalos de 14 dias usando apenas duas pulverizações.

LEGUMES: Crucíferas, Aipo, Alface	1 ml / 250 ml de água/planta 2 l/ha	Aplicar como “encharcamento” na transplantação. Repetir a aplicação em intervalos de 14 dias usando apenas duas pulverizações.
Trigo	2 l/ha	Aplicar na fase de crescimento 7 e repetir na fase de crescimento 13.
Uvas	2 l/ha 200 ml/100 l	Aplicar quando os rebentos atingem 2 a 5 cm em 500-1000 l de água/ha. Videiras que não dão fruto: Aplicar quando os rebentos atingem 2 a 5 cm e repetir 2 a 3 vezes com intervalos de 14 dias para desenvolvimento da raiz.
Tabaco	1 ml / 250 ml de água/planta 2 l/ha	Aplicar como “encharcamento” na transplantação. Repetir como pulverização. Se necessário, uma segunda pulverização pode ser aplicada 14 dias mais tarde.
Citrinos	2 l/ha	Aplicar a primeira pulverização na abertura dos botões e uma segunda pulverização quando a planta atinge 100% da floração.
Maçãs	200 – 400 ml/100 l até a um máximo de 4 l/ha	Em condições desfavoráveis para o crescimento da fruta, aplicar 4 semanas antes do início da colheita e repetir 14 dias mais tarde. Aplicar como pulverização de alto ou pequeno volume, mas assegurar que a concentração final no tanque permanece entre 200 e 400 ml/100 l de água.
Árvores de fruto perenes	200 ml/100 l	Árvores que não dão fruto: Iniciar as aplicações 2 a 3 semanas após a abertura dos botões. Aplicar 2 a 3 pulverizações como cobertura foliar com intervalos de 14 a 21 dias para o desenvolvimento da raiz. Árvores que dão fruto: Aplicar logo após o “ponto verde” e repetir 14 dias mais tarde.

IMPORTANTE: ANTES DE APLICAR MAXI-BOOST, CONSULTAR UM AGRÔNOMO QUALIFICADO OU UM ASSESSOR AGRÍCOLA SOBRE A NECESSIDADE DA SUA UTILIZAÇÃO.

BIO-FILM e **BIODEW** são produtos registados da Nulandis (Uma divisão da AECl Ltd.)