

Leer la etiqueta antes del uso

NIXELA™

FERTILIZANTE

MEZCLA LÍQUIDA DE CALCIO (Ca) Y MAGNESIO (Mg) CON BORO (B)

Para aplicación foliar

INGREDIENTES ACTIVOS:

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua	3.5%
Óxido de calcio (CaO) complejoado por HGA	3.5%
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua	1.4%
Óxido de magnesio (MgO) complejoado por HGA	1.4%
Boro (B) soluble en agua	0.2%
Boro (B) complejoado por HGA	0.2%

pH: 4.8 – 5.2

Agente complejante utilizado: Ácido Heptaglucónico (HGA)

Volumen: (1ℓ, 5ℓ, 25ℓ) – Peso neto (1.26kg, 6.3kg, 31.5kg)

Lote N°:

Fecha de fabricación:

RESPONSABLE DE LA PUESTA EN EL MERCADO:

Linmark Consulting Ltd

Hillock

Ballut Street

St Julian's, STJ 1373

Malta

FABRICANTE:

AECI Limited

Reg. N° 1924/002590/06

P.O. Box 14418

Witfield, 1467, Sudáfrica

Tel: (011) 823 8000



NIXELA™ es una marca comercial (pendiente) de AECI Limited



Atención

Indicación de peligro: H319 Provoca irritación ocular grave

Consejos de prudencia: P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

EN CASO DE URGENCIA llamar al Instituto Nacional de Toxicología: +34 91 562 04 20.

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente cuando no se utilice.

Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

INSTRUCCIONES DE USO: USAR SOLO COMO SE INDICA

- **NIXELA** no debe añadirse a ningún producto a base de azufre o fosfito

TABLA DE APLICACIÓN:

CULTIVO	TASA DE APLICACIÓN	MÉTODO DE APLICACIÓN
MANZANAS, PERAS	200-300 ml/100 l de agua hasta un máximo de 3 l/ha	Realizar 3-4 aplicaciones desde la floración (50%) y repetir con intervalos de 21 días. Para su uso en peras: No combinar Nixela con otros nutrientes foliares o adyuvantes.
CÍTRICOS	200-300 ml/100 l de agua hasta un máximo de 3 l/ha	Realizar 3-4 aplicaciones desde la caída de pétalos (100%) y repetir con intervalos de 28 días.
CUCURBITÁCEAS (CALABAZAS, SANDÍAS, MELONES Y PEPINOS)	500 ml/100 l de agua hasta un máximo de 4 l/ha	Aplicar en floración y repetir con intervalos de 21 días.
LECHUGA, COLIFLOR, REPOLLO, COL CHINA	500 ml/100 l de agua hasta un máximo de 3 l/ha	Comenzar las aplicaciones antes del inicio de la formación de la cabeza y repetir a intervalos de 14 a 21 días.
MELOCOTONES, NECTARINAS, CIRUELAS, ALBARICOQUES, ALMENDRAS, ACEITUNAS	200-300 ml/100 l de agua hasta un máximo de 3 l/ha	Realizar 3-4 aplicaciones desde la caída de pétalos (75%) y repetir a intervalos de 21 a 28 días. Si las condiciones climáticas favorecen las infecciones bacterianas, se pueden considerar aplicaciones adicionales.
PATATAS	500 ml/100 l de agua hasta un máximo de 4 l/ha	Aplicar al inicio del tubérculo y repetir a intervalos de 21 a 28 días.
TOMATES, PIMIENTOS, JUDÍAS, GUISANTES, CEBOLLAS	500 ml/100 l de agua hasta un máximo de 4 l/ha	Comenzar las aplicaciones antes de la fructificación y repetir a intervalos de 14 a 21 días.
TABACO	500 ml/100 l de agua hasta un máximo de 4 l/ha	Realizar 2-3 aplicaciones cada dos semanas, comenzando a una altura de 30 cm.

IMPORTANTE: ANTES DE APLICAR NIXELA, CONSULTE A UN AGRÓNOMO CUALIFICADO O ASESOR AGRÍCOLA SOBRE EL USO DEL PRODUCTO.