

QWEMIKELP®

كويميكلب

رقم تسجيل وزارة الزراعة الاردنية ٨٣٧٩ Jordanian Registration Number 8379

LIQUID NUTRIENT FOLIAR FEED COMPLEX

مركب عناصر سائل للاستخدام كسماد ورقي

سماد زراعي (المجموعة ٢) GROUP 2 FERTILIZER

LIQUID NUTRIENT FOLIAR FEED COMPLEX WITH SEAWEED FOR USE ON CROPS AS INDICATED.

مركب عناصر سائل مع الطحالب البحرية للاستخدام كسماد ورقي على جميع المحاصيل

COMPOSITION:

		التركيب الكيميائي	
Nitrogen (N)	77.4 g/kg (87.3 g/l)	نيتروجين	٧٧,٤ غ كغ (٨٧,٣ غرام/لتر)
Phosphorus (P)	10.7 g/kg (12 g/l)	فوسفور	١٠,٧ غ كغ (١٢ غرام/لتر)
Potassium (K)	8.8 g/kg (9.9 g/l)	بوتاس	٨,٨ غ كغ (٩,٩ غرام/لتر)
Sulfur (S)	0.87 g/kg (0.9 g/l)	كبريت	٠,٨٧ غ كغ (٠,٩ غرام/لتر)
Magnesium (Mg)	3.75 g/kg (4.23 g/l)	مغنيسيوم	٣,٧٥ غ كغ (٤,٢٣ غرام/لتر)
Iron (Fe)	1125 mg/kg (1269 mg/l)	حديد	١,١٢٥ غ كغ (١,٢٦٩ غرام/لتر)
Boron (B)	1502 mg/kg (1694 mg/l)	بورون	١,٥٠٢ غ كغ (١,٦٩٤ غرام/لتر)
Manganese (Mn)	564 mg/kg (636 mg/l)	منغنيز	٥٦٤ غ كغ (٠,٦٣٦ غرام/لتر)
Zinc (Zn)	370 mg/kg (417 mg/l)	زيتك	٣٧٠ غ كغ (٠,٤١٧ غرام/لتر)
Copper (Cu)	200 mg/kg (225 mg/l)	نحاس	٢٠٠ غ كغ (٠,٢٢٥ غرام/لتر)
Molybdenum (Mo)	237 mg/kg (267 mg/l)	موليبدينوم	٢٣٧ غ كغ (٠,٢٦٧ غرام/لتر)
(Contains seaweed) طحالب بحرية			

CONTENTS:

BATCH NO:

DATE OF MANUFACTURE:

UN NO.: Not regulated

المكونات:

رقم الدفعة:

تاريخ التصنيع:

رقم يو إن, غير منظم

REGISTRATION HOLDER IN COUNTRY OF ORIGIN حامل التسجيل في بلد المنشأ

Nulandis® (A division of AECL Ltd)

Reg. No. 1924/002590/06

P.O. Box 14418

Witfield, 1467

Tel : (011) 823 8000

www.nulandis.com



الشرقية الشركة - الاردن في الحصري الوكيل Exclusive Distributor in Jordan – Eastern Company



DIRECTIONS FOR USE : طرق الاستخدام :

USE ONLY AS INDICATED

يرجى الاستخدام فقط كما هو محدد

Shake well before use. يرجى الرج جيد قبل الاستخدام.

Ground application : في التربة :

Always dilute in a maximum 600 l water/ha and apply at a rate of 2 to 4 l/ha.

يخفف في 600 لتر مياه للهكتار الواحد في حد اقصاه و يستخدم بمعدل 2 – 3 لتر للهكتار

Aerial application : هوائي :

Dilute in 30 – 40 l water/ha and apply at a rate of 2 to 4 l/ha.

يخفف في 30 – 40 لتر مياه \ هكتار و يستخدم بمعدل 2 – 4 لتر للهكتار

APPLICATION TABLE : نسب الاستخدام :

CROP المحصول	APPLICATION METHOD طريقة الاستخدام
Citrus الحمضيات	Apply at bud swell and repeat at 21 day intervals. يستخدم عند بدء انتفاخ البرعم و يعاد الاستخدام كل 21 يوم
Cotton القطن	Apply at the 10-leaf stage and repeat with 14 day intervals. يستخدم عند وصول النبات لرحلة العشرة ورقات و يعاد الاستخدام كل 14 يوم
Legume crops البقوليات	Apply at the 4 th trifoliolate and repeat with 14 day intervals. يستخدم عند وصول النبات للتجمع الاوراق الثلاثي الرابع و يعاد الاستخدام كل 14 يوم
Maize الذرة	Apply at the 5 to 7-leaf stage. يستخدم عند وصول النبات للورقة الخامسة او السابعة
Potatoes البطاطا	Apply at the 6-leaf stage and repeat 14 days later. يستخدم عند وصول النبات للورقة السادسة و يعاد الاستخدام بعد 14 يوم
Sugarcane قصب السكر	Apply once the cane has reached a height of 60 cm. يستخدم عند وصول القصب طول 60 سم
Fruiting Vegetables: Cucumbers, Egg plant, Melons, Peppers, Squash and Tomatoes خضار	Apply at the 6-leaf stage and repeat with 14 day intervals. يستخدم عند وصول النبات للورقة السادسة و يعاد الاستخدام كل 14 يوم
Leaf Vegetables: Asparagus, Broccoli, Brussels sprout, Cabbages, Cauliflower, Celery, Chives, Lettuce, Parsley and Spinach الورقيات	Apply at the 6-leaf stage and repeat with 14 day intervals. يستخدم عند وصول النبات للورقة السادسة و يعاد الاستخدام كل 14 يوم
Root Vegetables: Beets, Carrots, Turnip, Parsnip and Radish الجذريات	Apply at the 6-leaf stage and repeat with 14 day intervals. يستخدم عند وصول النبات للورقة السادسة و يعاد الاستخدام كل 14 يوم
Wheat القمح	Apply at the 5 to 7-leaf stage. يستخدم عند وصول النبات للورقة الخامسة او السابعة
Sunflower عباد الشمس	Apply at the 5 to 7-leaf stage and repeat 14 days later. يستخدم عند وصول النبات للورقة الخامسة او السابعة و يعاد الاستخدام بعد 14 يوم