




good chemistry

QWEMIKELP



Nº do registo: DSV -224

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

Complexo de fertilizante líquido nutritivo foliar, com algas marinhas, para utilização em culturas conforme indicado.

GRUPO 2 FERTILIZANTE

COMPOSIÇÃO:

Nitrogen (N)	8.28 %m/v
Potassium (K)	0.76 %m/v
Magnesium (Mg)	0.36 %m/v
Iron (Fe)	0.12 %m/v
Boron (B)	0.16 %m/v
Manganese (Mn)	0.061 %m/v
Zinc (Zn)	0.048 %m/v
Copper (Cu)	0.9x10 ⁻³ %m/v
Molybdenum (Mo)	0.025 %m/v
(Contém algas marinhas)	

Número do Lote:
Data de fabrico:
Usar antes de:

Volume líquido:

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Agente:

AECI® Moçambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
T +258 84/82 274 7440

Fabricante:

AECI Plant Health uma divisão da AECI® Ltd
14 Field Road,
Boksburg
Republica da África do Sul
T +27 (11) 823 8000

UN No. Not Regulated / Não Regulado
P8038 MOZ06/23 V2

Não Perigoso

PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO

Agitar bem antes de usar.

Aplicação de Campo:

Diluir sempre num máximo de 600 ℓ de água/ha e aplicar a uma taxa de 2 a 4 ℓ/ha.

Aplicação Aérea:

Diluir em 30 – 40 ℓ de água/ha e aplicar a uma taxa de 2 a 4 ℓ/ha.

TABELA DE APLICAÇÃO:

CULTURA	MÉTODO DE APLICAÇÃO
Citrinos	Aplicar na altura do crescimento dos rebentos e repetir em intervalos de 21 dias.
Algodão	Aplicar na fase de 10 folhas e repetir em intervalos de 14 dias.
Leguminosas	Aplicar na 4ª trifoliada e repetir em intervalos de 14 dias.
Milho	Aplicar na fase de 5 a 7 folhas.
Batatas	Aplicar na fase de 6 folhas e repetir 14 dias mais tarde.
Cana-de-açúcar	Aplicar quando a plantação da cana-de-açúcar atinge 60 cm de altura.
Frutos de Hortícolas: Pepinos, Beringela, Melões, Pimentos, Squash e Tomate	Aplicar na fase de 6 folhas e repetir em intervalos de 14 dias.
Hortícolas de Folha: Espargos, Brócolos, Couves-de-bruxelas, Couves, Couve-flor, Aipo, Cebolinhos, Alface, Salsa e Espinafre	Aplicar na fase de 6 folhas e repetir em intervalos de 14 dias.
Tubérculos / Raízes Leguminosas: Beterrabas, Cenouras, Nabo, Pastinaga e Rabanete	Aplicar na fase de 6 folhas e repetir em intervalos de 14 dias.
Trigo	Aplicar na fase de 5 a 7 folhas.
Girassol	Aplicar na fase de 5 a 7 folhas e repetir 14 dias mais tarde.