

يرجى القراءة قبل الاستخدام

RAPPID® رابيد

Jordanian Registration Number 8380 رقم تسجيل وزارة الزراعة الاردنية ٨٣٨٠

Ammonium Polyphosphate

بوليفوسفات الأمونيوم

FERTILIZER GROUP 1

سماد زراعي (المجموعة ١)

ACTIVE INGREDIENTS:

Nitrogen (N) 97 g/kg
Phosphorus (P) 150 g/kg
SG 1,37 @20° C

المواد الفعالة:

نيتروجين ٩٧ غرام/كغ
الفسفور ١٥٠ غرام/كغ
الوزن النوعي ١.٣٧ عند ٢٠° س

Contents : المكونات
Batch No : رقم الدفعة
Date of Manufacture : تاريخ الانتاج

REGISTRATION HOLDER IN COUNTRY OF ORIGIN حامل التسجيل في بلد المنشأ

Nulandis (A division of AECI Limited)

Reg. No. 1924/002590/06

P.O. Box 14418

Witfield, 1467

Tel : (011) 823 8000

NULANDIS®
unlocking nature's potential

A business of
AECI
Plant & Animal
Health


Exclusive Distributor in Jordan – Eastern Company

الوكيل الحصري في الاردن – الشركة الشرقية



UN No. Not regulated

رقم يو إن: غير منظم



ارشادات الخلط:

MIXING INSTRUCTIONS:

1. Half fill tank to the required volume of water. ١. املأ الخزان لنصف حجم الماء المطلوب.
2. Add the required amount of RAPPID. ٢. أضف المقدار المطلوب من رابيد.
3. Add appropriate amount of wetting agent as per manufacturer's instruction. ٣. اضع المقدار المناسب من مادة لاصقة و ناشرة حسب ارشادات المصنع.
4. Fill the remainder of tank with water and maintain agitation. ٤. املأ باقي الخزان بالماء و استمر بالتحريك.

Product pH: 6.00 – 6.40
Specific Gravity at 20°C: 1.34 – 1.39
Ortho : Polyphosphate ratio = 10:90

الأس الهيدروجيني للمنتج: ٦,٤٠-٦,٥٠
الوزن النوعي عند ٢٠°س: ١,٣٤-١,٣٩
أورثو : نسبة البولي فوسفات = ٩٠:١٠

APPLICATION GUIDE:

جدول الاستعمال:

CROP المحصول	Application Method طريقة الاستخدام	Rate L/ Ha or as indicated معدل التدفق لتر \ هكتار أو كما هو مبني	DILUTION التخفيف	COMMENTS الملاحظات
WHEAT القمح	Irrigation ري	10-30	1:3	Apply at plant in P-retentive soils يستعمل على النباتات في الترب الحابسة للفوسفور
WHEAT القمح	Foliar ورقي	5-15	1:10-20	Apply as foliar at tillering يستعمل كمغذي للأوراق عند مرحلة الشطء
MAIZE الذرة		5-15	1:10-20	Apply 4-6 leaf stage to flowering يستعمل على النبات في مرحلة ٤ إلى ٦ ورقات إلى مرحلة الإزهار.
PASTURES مراعي		10-15	1:10-20	Apply at spring and autumn flush يستعمل في أعشاب الربيع والخريف
LEGUMES البقوليات		5-15	1:10-20	Apply at 3-4 weeks after emergence يستعمل بعد ٣ – ٤ أسابيع من الانبات
SUGARCANE قصب السكر	Planting زراع	15	min 100 l/ha ١٠٠ لتر \ هكتار حد ادنى	Apply with liquid fungicide at planting يستعمل مع مبيد الفطريات السائل عند الزراعة
SUGARCANE قصب السكر	Ratoon عقر	10-15	min 100 l/ha ١٠٠ لتر \ هكتار حد ادنى	Apply at foliar application stage يستعمل في مرحلة تغذية الأوراق
CITRUS, AVOCADOS, OLIVES الحمضيات, الأفوكادو, الزيتون		10-15	1:200	Apply during flush يستعمل أثناء نمو الأوراق الجديدة
BEANS, BRASSICA, STRAWBERRIES الفول, الكرنب, الفراولة		5-7	1:100	Apply at 4-6 leaf stage يستعمل على النبات في مرحلة 4 إلى 6 ورقات
CARROTS, POTATOES, TOMATOES, CUCURBITS الجزر, البطاطس, البندورة, القرع		5-7	1:100	Apply at seedling and vegetative stages يستعمل في مرحلة الشتلات والمرحلة الإنباتية.
WINE AND TABLE GRAPES الكرمة و العنب		5-10	1:200	From bud burst to flowering من التبرعم إلى الإزهار.

*Rates depend on soil type, soil pH and extent of phosphate lock up in the soil

* تعتمد معدلات التدفق على نوع التربة, وأسها الهيدروجيني ومدى احتباس الفوسفات فيها.