

Rappid

Ammonium Polyphosphate

أمونيوم بولي فوسفات

راييد

مصدر فعال للطاقة المستدامة

أزوت كلي (N) ١٣,٢٪ فوسفور (فوسفور) ٤٧٪

نسبة أورثو : بولي فوسفات ١٠ : ٩٠

إستيراد و توزيع :

Lawreel
توريد تريدينج TRADING

5 Litres

NULANDIS®
The one in crop care - Die een in gewasbeskerming

٤٥ شارع عبد السلام عارف عابدين - القاهرة - مصر
تليفون : ٧٧٢٥ ٢٧٩٤ ٠٢ + فاكس : ٣٤٨٠ ٢٢٩٠ ٠٢ +
محمول : ٣٤٣٨ ٢١٧ ١٢٢ ٠٢ +

Manufactured & Packaged by : NULANDIS
P.O. Box : 14418 - 1467
South Africa

أمونيوم بولي فوسفات Ammonium Polyphosphate

مركب رايبد هو سماد سائل عالي النقاوة علي صورة بولي فوسفات متعادل الحموضه.

فوائد رايبد :

- رايبد هو مصدر طاقة قوي يساعد النبات علي تكييف التضج و زيادة المخزون
- درجة الحموضه اقل من ٧ بما يتناسب مع ظروف المعامله رشاً او حقناً مع الري
- رايبد يرتبط بالكاتيونات في التربة مثل الزنك و المنجنيز مما يجعلها متاحة للنبات
- رايبد يحمي الفوسفور من الارتباط مع الكاتيونات النشطة مثل الكالسيوم و الحديد و الالومنيوم
- رايبد يتحلل من صورة البولي فوسفات المعقد الي صورة الاورثو فوسفات البسيط بصورة بطيئة مما يعني توفره للنبات لمدة زمنية طويلة
- معدل استخدام رايبد منخفض مقارنة بالاسمدة الفوسفاتية التقليدية و خصوصاً في التربة الفقيرة حيث انه يحفز نشاط المجموع الجذري
- رايبد يساعد علي تيسير الفوسفور المثبت بالتربة
- رايبد يمكن خلطه مع مبيدات الحشائش نظراً لدرجة الحموضة شبه المتعادلة له

طريقة الاستخدام :

- ملء الخزان بنصف كمية المياه المطلوبة للتطبيق
- إضافة كمية مناسبة من المادة الناشرة
- إضافة الكمية المطلوبة من مركب رايبد
- ملء الخزان بباقي كمية المياه المطلوبة للتطبيق مع الحفاظ على استمرار التقليب

المحصول	الاستخدام	نوع المعاملة	معدل الاستخدام
بطاطس - بنجر السكر - جزر - طماطم - فلفل - باذنجان وخيار	المعاملة بعد ٢٥ يوم من الزراعة و تكرر حتي مرتين كل ١٤ الي ٢١ يوم	رش ورقي	٢٥٠ - ٥٠٠ ملل/ ١٠٠ لتر ماء بمعدل من ١ الي ٣ لتر للفدان
الفاصوليا - الفراولة	المعاملة عند مرحلة ٤ - ٦ ورقات و تكرر كل اسبوعين	رش ورقي	٢٥٠ - ٥٠٠ ملل/ ١٠٠ لتر ماء بمعدل من ١ الي ٢ لتر للفدان
فول سوداني	المعاملة اسبوعين بعد التزهير و تكرر مرتين الي ثلاث مرات بفارق اسبوعين بين الرشاش	رش ورقي	٢٥٠ - ٥٠٠ ملل/ ١٠٠ لتر ماء بمعدل من ١ الي ٢ لتر للفدان
عنب المائدة	المعاملة عند تفتح البراعم و تكرر كل ١٠ ايام حتي التزهير	رش ورقي	٢٥٠ - ٥٠٠ ملل/ ١٠٠ لتر ماء بمعدل من ١ الي ٣ لتر للفدان
كمثري	المعاملة قبل بدء التزهير و تكرر اثناء مراحل التزهير و العقد حتي اربع مرات بفارق ١٠ الي ١٤ يوم بين الرشاش	رش ورقي	٢٥٠ ملل/ ١٠٠ لتر ماء بحد اقصى ٣ لتر للفدان
شمش و خوخ	المعاملة قبل بدء التزهير و تكرر عند اكتمال التزهير و تكرر حتي ثلاث مرات بفارق ١٠ الي ١٤ يوم بين الرشاش	رش ورقي	٢٥٠ - ٥٠٠ ملل/ ١٠٠ لتر ماء بحد اقصى ٤ لتر للفدان
الموالح - المانجو - الزيتون	المعاملة عند بدء التزهير و تكرر عند اللزوم من ٢ الي ٣ مرات بفارق اسبوع. يتم ايضا المعاملة اثناء فترة التحجيم و تكرر ٢ الي ٣ مرات	رش ورقي	٢٥٠ - ٥٠٠ ملل/ ١٠٠ لتر ماء بحد اقصى ٦ لتر للفدان
الموز	الاضافة في شهر ٦ و تكرر كل ١٠ الي ١٤ يوم	ري	من ١ الي ٢ لتر للفدان
الموز	المعاملة علي الخلف في شهر ٧ و تكرر كل ١٠ الي ١٤ يوم	رش ورقي	٢٥٠ - ٥٠٠ ملل/ ١٠٠ لتر ماء بمعدل من ١ الي ٢ لتر للفدان
البقوليات	الاضافة عند ٣ - ٤ اسابيع بعد الانبات	ري	من ١ الي ٢ لتر للفدان
قمح	الاضافة عند الزراعة في تربة فقيرة	ري	من ٤ الي ١٢ لتر للفدان
قمح	المعاملة بدأ من عمر ٦ الي ٧ اوراق و تكرر عند مرحلة التفريد	رش ورقي	٢٥٠ - ٥٠٠ ملل/ ١٠٠ لتر ماء بمعدل من ١ الي ٢ لتر للفدان
الذرة	الاضافة عند مرحلة ٤ - ٦ ورقات و تكرر حتي مرحلة التزهير	ري	من ٢ الي ٦ لتر للفدان
الذرة	المعاملة عند مرحلة التفريد	رش ورقي	٢٥٠ - ٥٠٠ ملل/ ١٠٠ لتر ماء بمعدل من ١ الي ٢ لتر للفدان
البرسيم والمراعي	الاضافة كل حشه عند طول ١٥ سم	ري	من ٢ الي ٤ لتر للفدان

- عمل اختبار الخلط في تنك الرش و متابعة اي اعراض سمية قبل تعميم الرش.
- يمكن استخدام التركيز الاقل في حالة استخدام حجم محلول رش عالي و استخدام التركيز الاعلي في حالة استخدام حجم محلول رش منخفض.
- يتوقف المعدل المستخدم علي درجة نقص العنصر.

تاريخ الانتاج :

رقم التشغيل :

مدة الصلاحية :

رقم التسجيل المحلي: ٩٣٧٧/٢ في ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٧ (معنة)

حجم العبوة : ٥ لتر

بلد المنشأ : جنوب أفريقيا

المادة الفعالة : أزوت كلي (N) ١٣,٢ % فوسفور (ف٥) ٤٧ %