



Polifosfato de Amónio

Polifosfato de amónio para ser usado como fonte nutricional de nitrogénio e fosfato.

COMPOSIÇÃO:

Nitrogénio (N)..... 9.7 %m/m (13.2 %m/v)
Fósforo (P).....15.0 %m/m (20.6 %m/v)

SG 1,34 – 1,39 @20 °C
pH 6,00 – 6,40
Orto: Rácio de polifosfato = 10:90

Agente:


AECI Moçambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
T +258 84/82 274 7440

 é uma marca pendente da AECI Ltd.

©AECI Limited. É proibida qualquer reprodução não autorizada deste rótulo.

UN No. Not Regulated / Não Regulado

good chemistry



ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

Nº do registo: DSV-225

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Volume líquido:

Fabricante:

AECI® Limited
19 van Eck Street,
Chamdor, Krugersdorp,
Republica da África do Sul
T +27 (11) 823 8000

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

**PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.**

P8014 MOZ08/22 V1

Não Perigoso



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO**INSTRUÇÕES DE MISTURA:**

1. Encher o tanque até a quantidade necessária de água
2. Adicionar a requerida quantidade de RAPPID
3. Adicionar a quantidade adequada de agente molhante de acordo com as instruções do fabricante
4. Acabar de encher o tanque com água e manter a agitação

GUIA DE APLICAÇÃO:

CULTURA		TAXA <i>ℓ</i> /ha	DILUIÇÃO	OBSERVAÇÕES
TRIGO	Irrigação	10-30	1:3	Aplicar na planta em solos P-retentivos
TRIGO	Foliar	5-15	1:10-20	Aplicar nas folhas na altura dos rebentos
MILHO		5-15	1:10-20	Aplicar na fase de 4-6 folhas até à floração
PASTOS		10-15	1:10-20	Aplicar nos rebentos da primavera e outono
LEGUMES		5-15	1:10-20	Aplicar 3-4 semanas após o aparecimento das plântulas
CANA-DE-AÇÚCAR	Plantação	15	min 100 <i>ℓ</i> /ha	Aplicar com fungicida líquido na plantação
CANA-DE-AÇÚCAR	Rebentos depois de cortada (cana-soca)	10-15	min 100 <i>ℓ</i> /ha	Aplicar na fase da pulverização foliar
CITRINOS, ABACATES, AZEITONAS		10-15	1:200	Aplicar durante o brotamento
FEIJÕES, BRASSICA, MORANGOS		5-7	1:100	Aplicar na fase de 4-6 folhas
CENOURAS, BATATAS, TOMATES, CUCURBITÁCEAS		5-7	1:100	Aplicar na fase de plântula e período vegetativo
UVAS DE MESA E DE VINHO		5-10	1:200	A partir do brotamento até à floração

***As taxas dependem do tipo de solo, do pH do solo e do grau de retenção do fosfato no solo**