

يرجى القراءة قبل الاستخدام

# رأبید کیہ RAPPID® K

رقم تسجيل وزارة الزراعة الاردنية ٨٤٠١ Jordanian Registration Number 8401

POTASSIUM POLYPHOSPHATE

بوليفوسفات البوتاسيوم

FERTILIZER GROUP 1

سماد زراعي (المجموعة ١)

COMPOSITION:

|                |          |
|----------------|----------|
| Phosphorus (P) | 76 g/kg  |
| Potassium (K)  | 133 g/kg |

التركيب الكيميائي

|          |             |
|----------|-------------|
| فسفور    | ٧٦ غرام/كغ  |
| بوتاسيوم | ١٣٣ غرام/كغ |

SG 1.3 to 1.38 @ 20° C  
Product pH: 6.50 – 7.00

الوزن النوعي ١.٣ إلى ١.٣٨ عند ٢٠° س  
الأس الهيدروجيني: ٦.٥٠ إلى ٧.٠٠

Contents : المكونات  
Batch No : رقم الدفعة  
Date of Manufacture : تاريخ الانتاج

REGISTRATION HOLDER IN COUNTRY OF ORIGIN : حامل التسجيل في بلد المنشأ  
Nulandis (A division of AECI Limited)  
Reg. No. 1924/002590/06  
P.O. Box 14418  
Witfield, 1467  
Tel : (011) 823 8000

**NULANDIS®**  
unlocking nature's potential

A business of  
**AECI**  
Plant & Animal  
Health

Exclusive Distributor in Jordan – Eastern Company  
الوكيل الحصري في الاردن – الشركة الشرقية



UN No. Not regulated

رقم يو إن: غير منظم



**PROPERTIES:**

A potassium based product, with no nitrogen, for reproductive growth nutrition.  
**Rappid K** has a near-neutral pH of 6.50 – 7.0  
 This product is highly plant available due to its pure, concentrated formulation.  
 It is effective as an instant source of P and K, but also has a sustained effect on the nutrient levels of the plant.  
 Ease of application and better control.  
 Contains (P) in the polyphosphate form.

**MIXING INSTRUCTIONS:**

Half fill tank to the required volume of water.  
 Add the required amount of Rappid K.  
 Add any registered wetting agent, as per the registration holder's label instruction.  
 Fill the remainder of tank with water and maintain agitation.

**الخصائص :**

منتج ذو أساس بوتاسيومى، ولا يحتوي على النيتروجين يستخدم في تغذية النمو التكاثري  
 رايبيد كيه يحتوي على أس هيدروجيني شبه متعادل ٦,٥٠ – ٧,٠٠  
 هذا المنتج متاح للنباتات بشكل عالي نظرا إلى نقاء وتركيز تركيبته الكيميائية. وهو منتج فعال  
 بوصفه مصدرا فوريا للفسفور والبوتاسيوم، لكن لديه تأثير مستمر على مستويات مغذيات النبات  
 سهولة في الاستخدام و التحكم الافضل  
 يحتوي على الفسفور على هيئة البولي فوسفات

**إرشادات الخلط :**

املا الخزان لنصف حجم الماء المطلوب  
 أضف المقدار المطلوب من رايبيد كيه  
 أضف أي مادة لاصقة و ناشرة مسجلة، بحسب بطاقة إرشادات صاحب التسجيل  
 املا باقي الخزان بالماء واستمر بالخص

**APPLICATION TABLE: جدول الاستعمال**

| CROP<br>المحصول        |                  | RATE ℓ/ha or as indicated<br>معدل التدفق لتر/هكتار أو كما هو مؤشر                                                  | DILUTION<br>التخفيف                            | RECOMMENDATIONS<br>التوصيات                                                                                                                           |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WHEAT<br>القمح         | Irrigation<br>ري | 10 - 30                                                                                                            | 1:3                                            | Apply at plant in P-retentive soils<br>يستعمل على النباتات في التربة الحابسة للفسفور                                                                  |
| WHEAT<br>القمح         | Foliar<br>ورقي   | 3 - 5                                                                                                              | 1:10-20                                        | Apply as foliar at 6 to 7 leaf stage as well as at tillering<br>يستعمل كمغذي للأوراق في مرحلة وجود ٦ إلى ٧ ورقات بالإضافة إلى مرحلة الشطف             |
| MAIZE<br>الذرة         |                  | 3 - 5                                                                                                              | 1:10-20                                        | Apply 6 to 7 leaf stage through to tasselling<br>يستعمل على النبات في مرحلة ٦ إلى ٧ ورقات مروراً بالشراشيب                                            |
| PASTURES<br>مراعي      |                  | 5 - 10                                                                                                             | 1:10-20                                        | Apply at spring and autumn flush<br>يستعمل في أعشاب الربيع والخريف                                                                                    |
| LEGUMES<br>البقوليات   |                  | 3 - 5                                                                                                              | 1:10-20                                        | Apply at first flower and repeat at podfill<br>يستعمل في الزهرة الأولى إلى امتلاء القرن                                                               |
| SUGARCANE<br>قصب السكر | Planting<br>زرع  | 15                                                                                                                 | minimum 100 ℓ/ha<br>١٠٠ لتر/هكتار حد أدنى      | Apply at planting in furrow.<br>Can be combined with most kelp products #<br>يستعمل على النبات في الثل<br>يمكن أن يمزج مع أغلب منتجات طحلب الكلب #    |
| SUGARCANE<br>قصب السكر | Ratoon<br>عقر    | 10                                                                                                                 | minimum 200 ℓ/ha<br>٢٠٠ لتر/هكتار حد أدنى      | Apply at 30 cm and 60 cm ratoon height as a foliar to enhance the RV<br>١٠٠ لتر/هكتار حد أدنى                                                         |
| CITRUS<br>الحمضيات     |                  | 1 to 2 ℓ / 100 ℓ of water.<br>Maximum rate 15 ℓ/ha<br>١ إلى ٢ لتر / ١٠٠ لتر ماء<br>معدل التدفق الأقصى ١٥ لتر/هكتار | 1 000 to 2 000 ℓ/ha<br>١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ لتر/هكتار | Apply just before flowering, at fruit enlargement and ripening/brix building stage<br>يستعمل قبل الإزهار، وفي تكبير الثمار وفي مرحلة النضج/بناء السكر |

| CROP<br>المحصول                              |  | RATE ℓ/ha or as indicated<br>معدل التدفق لتر/هكتار أو كما هو مؤشر | DILUTION<br>التخفيف                      | RECOMMENDATIONS<br>التوصيات                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOMATOES, STRAWBERRIES<br>البندورة، الفراولة |  | 3 to 5 ℓ/ha<br>٣ إلى ٥ لتر/هكتار                                  | 250 to 500 ℓ/ha<br>٢٥٠ إلى ٥٠٠ لتر/هكتار | Apply first application at flowering and repeat every 14 days during fruit enlargement and ripening.<br>يستعمل في المرة الأولى في مرحلة الإزهار ويكرر الاستعمال كل ١٤ يوم خلال مرحلة تكبير الثمار ونضوجها |
| POTATOES, CARROTS<br>البطاطس، الجزر          |  | 5 to 7 ℓ/ha<br>٥ إلى ٧ لتر/هكتار                                  | 500 ℓ/ha<br>٥٠٠ لتر/هكتار                | Apply at tuber initiation, and repeat every 14 to 21 days<br>يستعمل في بدء نمو الدرنات، ويكرر الاستعمال كل ١٤ إلى ٢١ يوما                                                                                 |
| WINE AND TABLE GRAPES<br>كرمة و العنب        |  | 5 to 7 ℓ/ha<br>٥ إلى ٧ لتر/هكتار                                  | 1 000 ℓ/ha<br>١٠٠٠ لتر/هكتار             | Apply at fruit set, pea size fruit stage and at ripening stage<br>يستعمل في مرحلة الاثمار وفي مرحلة وصول الثمرة إلى حجم البزلاء وفي مرحلة النضج                                                           |

\* Rates depend on soil type, soil pH and extent of phosphate lock up in the soil.

# Test for tank mix compatibility and potential phytotoxicity before applying on a large-scale.

\* تعتمد معدلات التدفق على نوع التربة، وأسهها الهيدروجيني ومدى احتباس الفوسفات فيها  
 ## يرجى إجراء تجربة توافق المزج ومدى السمية في خزان قبل الاستعمال بكميات كبيرة