



good chemistry

SOMO



Nº do registo: DSV -219

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

Aplicação foliar ou tratamento de sementes para a prevenção e correção da carência do molibdénio.

GRUPO 2 FERTILIZANTE

COMPOSIÇÃO:

Molibdato de Sódio 39 %m/m

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Peso líquido:

Agente:

AECI® Moçambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
T +258 84/82 274 7440

Fabricante:

AECI Plant Health uma divisão da AECI® Ltd
14 Field Road,
Boksburg
Republica da África do Sul
T +27 (11) 823 8000

UN No. Not Regulated / Não Regulado

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

P8101 MOZ06/23 V2



Causa irritação nos olhos e na pele.
Pode causar irritação respiratória.

PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA
FOLHETO ANEXADO.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO

CULTURA	TAXA DE APLICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Cucurbitáceas	2 g/ℓ	Deixe as sementes de molho de um dia para o outro numa solução de 0,2 % e plante diretamente a seguir.
Crucíferas	100 – 250 g/ha	Aplicar uma pulverização foliar em água suficiente sobre as plantas jovens.
Luzerna / Alfafa	125 – 250 g/ha	Tratamento das sementes em simultâneo com a inoculação.
Pastagens de Gramíneas / Trevo	155 g/ha	Pulverização foliar sobre novos rebentos após o corte.
Milho	50 g/ 1,25 ℓ de água	Colocar 100 kg de sementes num cilindro com tampa à prova de água. Adicionar a solução e fazer girar o cilindro durante 15 - 20 minutos. As sementes podem ser tratadas em qualquer altura antes de serem semeadas.
Girassol	25 g/ 25 kg de sementes 5 g/100 ℓ de água até um máximo de 75 g/ha	Uma solução contendo SOMO deve ser aplicada uniformemente sobre as sementes. Aplicar sobre as mudas / plântulas como pulverização foliar total.
Tomates	250 g/ha	Aplicar sobre os sulcos de plantio antes da transplantação ou como pulverização foliar.
Soja	75 - 125 g/ha	Aplicar sobre as mudas / plântulas como pulverização foliar.

REPETIÇÃO DO TRATAMENTO:

Dependendo da quantidade de SOMO aplicada, são recomendados os seguintes intervalos entre as reaplicações:

QUANTIDADE DE SOMO APLICADA POR HECTARE	PERÍODO DE INTERVALO ENTRE OS TRATAMENTOS
Menos de 75 g	1 ano
Entre 75 - 150 g	2 - 3 anos
Mais de 150 g	4 - 5 anos

IMPORTANTE:

Antes de aplicar este fertilizante, deve consultar um Agrónomo ou Assessor Agrícola qualificados sobre a necessidade da sua utilização.