

SPRAYBOR



Nº do registo: DSV -220

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

Borato de sódio solúvel em água

GRUPO 2 FERTILIZANTE

COMPOSIÇÃO:

Boro (B) 16.5 %m/m

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Peso líquido:

Agente:

AECI® Moçambique, Limitada

Rua da Imprensa, Número 312,

19º andar - Esquerda

Cidade de Maputo, Moçambique

T +258 84/82 274 7440

Fabricante:

AECI Plant Health uma divisão da AECI® Ltd

14 Field Road,

Boksburg

Republica da África do Sul

T +27 (11) 823 8000

UN No. Not Regulated / Não Regulado



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

PXXXX MOZ06/23 V2

Nocivo se inalado ou ingerido. Provoca
irritação ocular e ao sistema respiratório

PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO
ANEXADO.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: USAR APENAS COMO INDICADO

SPRAYBOR é uma forma de boro, solúvel na água, que pode ser usado como pulverização foliar ou como tratamento aplicado diretamente no solo.

SPRAYBOR pode ser aplicado na altura da plantação ou depois, ou como pulverização foliar nas culturas.

NÃO EXCEDER A SOLUÇÃO DE RESERVA EM MAIS DE 5% PARA APLICAÇÕES AÉREAS.

COMPATIBILIDADE:

SPRAYBOR poder ser utilizado com a maioria dos fertilizantes foliares. É contudo recomendado efetuar um teste de compatibilidade numa área pequena e examinar a área tratada durante 3 dias antes de se efetuarem aplicações comerciais.

SPRAYBOR não é compatível com o sulfato de zinco, sulfato de manganês, calda sulfocálcica ou formulações à base de óleo miscíveis.

TABELA DE APLICAÇÃO:

CULTURA	DOSAGEM	MÉTODO DE APLICAÇÃO
Maçãs, peras, damascos, ameixas, pêssegos, cerejas	1,25 - 2,5 kg/ha Não exceder uma concentração de 100 g/100 ℓ de água	Aplicar dois tratamentos: 1. A 30% da floração. 2. Pós colheita no outono.
Uvas	1,0 - 2,5 kg/ha 50 - 100 g/100 ℓ de água 100 - 200 g/100 ℓ de água	Aplicar dois tratamentos: 1. Mesmo antes do período de floração. 2. Tratamento pós colheita.
Citrinos	1,0 - 2,5 kg/ha Máximo de 25 - 50 g/árvore	Espalhar uniformemente na zona de gotejamento das árvores. Não repetir o tratamento durante um período de 3 anos e não tratar árvores jovens.
	1,0 - 2,5 kg/ha 100 - 200 g/100 ℓ de água	Não aplicar mais do que uma vez por ano como pulverização de cobertura total. Usar em 1 000 - 2 000 ℓ de água/ha.
Batatas, amendoins e outras culturas	175 - 350 g/ha	Aplicar 4 - 5 vezes por estação com intervalos de 3 semanas como pulverização aérea ou por trator. Durante os anos seguintes, devem ser aplicados dois tratamentos.
Cebolas	375 - 750 g/ha	Aplicar o primeiro tratamento 3 semanas após o estabelecimento das plantas e repetir 3 semanas mais tarde.
Girassóis, couve-flor, outras espécies de couve e tomates	375 - 750 g/ha	Aplicar como pulverização de cobertura total. Repetir após o desenvolvimento de novas folhas. Se necessário, aplicar uma terceira pulverização.
Algodão	375 - 750 g/ha	Aplicar como pulverização de cobertura total na fase da floração ou logo a seguir a esta.
Flores e Plantas Ornamentais	75 - 150 g/100 ℓ de água	Aplicar 2 a 3 pulverizações mensalmente, logo que as plantas se tenham estabelecido.
Tabaco	350 - 750 g/ha	Aplicar entre 4 a 5 vezes em intervalos de 3 semanas. Aplicar como pulverização aérea ou por trator.
Abacates	1,25 - 2,5 kg/ha	Aplicar como pulverização de cobertura total para manter os níveis de boro. Repetir após a colheita.
Macadâmias	50 - 150 g/100 ℓ de água	Aplicar como pulverização de cobertura total para manter os níveis de boro.
Luzerna/ Alfafa 0-15% argila 16-30% argila > 31% argila	250 - 500 g/ha 500 - 1 000 g/ha 750 - 1 500 g/ha	1. Tratamento de Manutenção: Aplicar como tratamento de pulverização total, 10 dias após o corte da planta.
0-15% argila 16-30% argila > 31% argila	3 kg/ha 4.5 kg/ha 6 kg/ha máximo (incorporado a uma profundidade de 10-15 cm)	2. Tratamento Corretivo: Aplicar uma única pulverização de cobertura total, logo a seguir ao corte da planta depois de se verificar que os 15 cm superiores da planta contêm menos de 20 mg de Boro/kg (20ppm) antes do período da floração. Os níveis de boro podem depois ser reanalisados e ajustados se necessário, com base em análises do solo.
Milho Aplicação no solo antes da plantação 0-15% argila 16-30% argila > 31% argila	3 kg/ha 4.5 kg/ha 6 kg/ha máximo (incorporado a uma profundidade de 10-15 cm)	Pulverizar uniformemente sobre o solo antes da preparação final para a plantação, exceto quando a análise das folhas da cultura anterior possa permitir a omissão do tratamento.
Girassóis Aplicação no solo antes da plantação 0-15% argila 16-30% argila > 31% argila	3 kg/ha 4.5 kg/ha 6 kg/ha máximo (incorporado a uma profundidade de 10-15 cm)	Em solo destinado à cultura de girassóis pulverizar o solo uniformemente antes da preparação final para a plantação. Quando a análise das folhas da cultura anterior permitir, o tratamento pode ser omitido.

IMPORTANTE: Antes da aplicação de SPRAYBOR, consulte um Agrónomo ou Assessor Agrícola qualificados sobre a necessidade da sua utilização. Utilizar as taxas mais baixas recomendadas para manter os níveis de boro. Utilizar as taxas mais altas recomendadas para corrigir carências. Quando quaisquer fertilizantes da gama Max forem usados em combinação com Spraybor, utilizar sempre as taxas mais baixas recomendadas.