

STOMAWET

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Antes de utilizar este produto, ler o rótulo na íntegra, incluindo todas as precauções e instruções de utilização. Pode causar grave irritação ocular. Nocivo se ingerido ou absorvido através da pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Manter fora do alcance de crianças, pessoas não informadas e animais. Seguir as advertências no rótulo do produto do remédio agrícola a ser utilizado em combinação com Stomawet. Não utilizar Stomawet em combinação com outros agentes molhantes. Embora Stomawet seja um adjuvante comprovado e altamente eficaz, a sua acção pode ser influenciada por factores como a altura da aplicação, condições climáticas, métodos de aplicação, estado da cultura e misturas com outros produtos não especificamente recomendados. Uma vez que estas condições estão fora do controlo do detentor do registo, é fortemente recomendado que o utilizador avalie a situação antes da aplicação, a fim de ajustar as sagens e os volumes de pulverização em conformidade. Reentrada: Não entrar na área tratada no prazo de 1 dia após o tratamento, a não ser que use vestuário de protecção. Em caso de intoxicação – CHAMAR O MÉDICO E DISPONIBILIZAR-LHE ESTE RÓTULO.

SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO HUMANA:

Pode causar náuseas, desconforto abdominal, vómitos, diarreia, irritação cutânea, irritação ocular e visão turva.

PRIMEIROS SOCORROS:

Contacto ocular: Verificar e retirar quaisquer lentes de contacto. Em caso de contacto ocular, lavar imediatamente os olhos com bastante água durante pelo menos 15 minutos. Pode ser utilizada água fria. Procurar imediatamente assistência médica.

Contacto cutâneo: Lavar imediatamente a pele com bastante água durante 15 minutos enquanto se retira a roupa e sapatos contaminados. Procurar assistência médica se a irritação persistir.

Ingestão: NÃO induzir o vómito a não ser que seja indicado por pessoal médico. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Alargar roupa apertada, tal como colarinho, gravata, cinto ou cós. Procurar assistência médica imediatamente.

Inalação: Retirar a vítima para o ar fresco. Aplicar respiração artificial, se necessário. Se a respiração for difícil, administrar oxigénio. Procurar assistência médica.

NOTA PARA O MÉDICO:

Não há antídoto específico. Tratar sintomaticamente.



ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

SUBSTÂNCIAS ACTIVAS

Heptametiltrisiloxano 1 000 g/ℓ

UM ADJUVANTE DE ORGANO-SILICONE NÃO IÓNICO PARA UTILIZAÇÃO COM REMÉDIOS AGRÍCOLAS PARA PROTECÇÃO DAS CULTURAS, COMO INDICADO.

Nº do reg
DSV- 2450



Volume líquido:

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

UN No.: 3082 - Environmentally hazardous substance, liquid, N.O.S. (Polyether siloxane)

MANTER AFASTADO DAS CRIANÇAS

Agente:

AECI Moçambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
T +258 84/82 274 7440

Fabricante:

AECI® Limited
P.O. Box 14418, Witfield, 1467
Republica da África do Sul
T +27 (11) 823 8000

PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO. P8137 MOZ10/21 V2



STOMAWET

UM ADJUVANTE DE ORGANO-SILICONE NÃO IÓNICO PARA UTILIZAÇÃO COM REMÉDIOS AGRÍCOLAS PARA PROTECÇÃO DAS CULTURAS, COMO INDICADO.

INGREDIENTE ACTIVO:

Heptametiltrisiloxano 1 000 g/ℓ

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Antes de utilizar este produto, ler o rótulo na íntegra, incluindo todas as precauções e instruções de utilização.

Pode causar grave irritação ocular.

Nocivo se ingerido ou absorvido através da pele.

Tóxico para os organismos aquáticos.

Manter fora do alcance de crianças, pessoas não informadas e animais.

Seguir as advertências no rótulo do produto do remédio agrícola a ser utilizado em combinação com **Stomawet**.

Não utilizar **Stomawet** em combinação com outros agentes molhantes.

Embora **Stomawet** seja um adjuvante comprovado e altamente eficaz, a sua acção pode ser influenciada por factores como a altura da aplicação, condições climáticas, métodos de aplicação, estado da cultura e misturas com outros produtos não especificamente recomendados. Uma vez que estas condições estão fora do controlo do detentor do registo, é fortemente recomendado que o utilizador avalie a situação antes da aplicação, a fim de ajustar as dosagens e os volumes de pulverização em conformidade.

Reentrada: Não entrar na área tratada no prazo de 1 dia após o tratamento, a não ser que use vestuário de protecção. Em caso de intoxicação – CHAMAR O MÉDICO E DISPONIBILIZAR-LHE ESTE RÓTULO.

EMBORA ESTE ADJUVANTE TENHA SIDO EXTENSIVAMENTE TESTADO SOB UMA GRANDE VARIEDADE DE CONDIÇÕES, O DETENTOR DO REGISTO NÃO GARANTE QUE O PRODUTO SERÁ EFICAZ SOB TODAS AS CONDIÇÕES UMA VEZ QUE A SUA ACÇÃO E EFEITO PODEM SER AFECTADOS POR FACTORES COMO CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ARMAZENAMENTO ANORMAIS; QUALIDADE DA ÁGUA DE DILUIÇÃO, COMPATIBILIDADE COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS NÃO INDICADAS NO RÓTULO BEM COMO O MÉTODO, ALTURA E PRECISÃO DA APLICAÇÃO. O DETENTOR DO REGISTO NÃO ACEITA AINDA RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS ÀS CULTURAS, VEGETAÇÃO, AMBIENTE, OU DANOS A PESSOAS E ANIMAIS OU INEFICIÊNCIA DO ADJUVANTE EM CAUSA POR O UTILIZADOR NÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO OU DEVIDO A CONDIÇÕES QUE NÃO PODERIAM TER SIDO ANTECIPADAS NOS TERMOS DESTES REGISTOS. CONSULTAR O FORNECEDOR CASO EXISTA ALGUMA INCERTEZA SOBRE O PRODUTO.

Segurança durante a mistura e aplicação:

Evitar o contacto com a névoa de pulverização.

Evitar o contacto do concentrado com a pele e os olhos. Usar vestuário de protecção (luvas, óculos de protecção e protecção facial) durante a mistura.

Se houver contacto com a solução de pulverização contendo um remédio agrícola, seguir as instruções no rótulo. Não aplicar este produto de forma a expor, directamente ou através da sua dispersão, os trabalhadores ou outras pessoas.

Além disso, seguir as declarações de precaução indicadas no rótulo do(s) remédio(s) agrícola(s).

Não comer nem beber ou fumar enquanto se mistura ou aplica o produto ou antes de lavar as mãos e o rosto e mudar de roupa.

Não pulverizar sobre ou contaminar os recursos hídricos.

Prevenir a contaminação de alimentos, rações, água potável e utensílios de cozinha.

Segurança após utilização:

Limpar cuidadosamente o aplicador com **FLUSHSOL** antes de o reutilizar e eliminar a água de lavagem onde não possa contaminar culturas, pastagens, rios e barragens. Consultar o rótulo de **FLUSHSOL** para instruções de utilização.

Quando vazio, inverter o recipiente sobre o tanque de pulverização ou de mistura e deixar escoar durante pelo menos 30 segundos após o fluxo ficar reduzido a gotejamento. A seguir, lavar o recipiente três vezes com um volume de água igual a pelo menos um décimo do volume do recipiente e adicionar as águas de lavagem ao conteúdo do tanque de pulverização. Destruir o recipiente, perfurando ou achatando o mesmo, e não o utilizar para qualquer outro fim.

Armazenamento:

Guardar apenas no recipiente original. Manter o recipiente hermeticamente fechado. Não permitir a entrada de água neste recipiente.

Não armazenar perto do calor ou de chamas abertas.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO:

Stomawet é um produto 100% silicone orgânico, que foi comprovado como tendo capacidades fortes e eficazes de humedecimento quando utilizado em misturas de pulverização aquosas. Os surfactantes de organo-silicone são uma classe distinta de agentes molhantes não iónicos que têm capacidade para baixar a tensão superficial das misturas aquosas quando utilizados para baixar as taxas de utilização comparativamente com os surfactantes orgânicos convencionais não iónicos. Portanto, para melhores resultados, recomenda-se que 100% de organo-silicone seja utilizado apenas quando especificamente recomendado pelo Detentor do Registo / Distribuidor sobre a utilização de adjuvante com base de silicone orgânico. A aplicação ideal e os consequentes efeitos podem ser influenciados por muitos factores. Por conseguinte, recomenda-se que seja feita uma observação cuidadosa do depósito de pulverização e a taxa de adjuvante ajustada em conformidade para assegurar uma cobertura completa sem escorrimento indevido.

SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO HUMANA:

Pode causar náuseas, desconforto abdominal, vômitos, diarreia, irritação cutânea, irritação ocular e visão turva.

PRIMEIROS SOCORROS:

Contacto ocular: Verificar e retirar quaisquer lentes de contacto. Em caso de contacto ocular, lavar imediatamente os olhos com bastante água durante pelo menos 15 minutos. Pode ser utilizada água fria. Procurar imediatamente assistência médica.

Contacto cutâneo: Lavar imediatamente a pele com bastante água durante 15 minutos enquanto se retira a roupa e sapatos contaminados. Procurar assistência médica se a irritação persistir.

Ingestão: NÃO induzir o vômito a não ser que seja indicado por pessoal médico. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Alargar roupa apertada, tal como colarinho, gravata, cinto ou cós. Procurar assistência médica imediatamente.

Inalação: Retirar a vítima para o ar fresco. Aplicar respiração artificial, se necessário. Se a respiração for difícil, administrar oxigénio. Procurar assistência médica.

NOTA PARA O MÉDICO:

Não há antídoto específico. Tratar sintomaticamente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO

Instruções gerais:

Stomawet foi considerado eficaz em aplicação agrícola a uma concentração de 0,025% v/v (25 ml / 100 ℓ mistura de pulverização). Não adicionar adjuvante a um nível que exceda 5% do volume de pulverização final. Quando isto ocorre, ajustar as taxas para obter uma cobertura completa sem excesso de escorrimento. Pode haver diminuição do desempenho de **Stomawet** se o pH da solução de pulverização for excessivamente alto (acima de 9) ou baixo (abaixo de 5). O desempenho óptimo resultará entre um pH 6 e 8. O **Stomawet** é recomendado nas seguintes situações:

Como adjuvante para herbicidas:

Para herbicidas que contenham glifosato e paraquato, aplicar **Stomawet** a uma taxa de 50 - 100 ml / 100 ℓ mistura de pulverização. **Stomawet** não é recomendado para ser usado com formulações de glifosato contendo amina de sebo.

Suplemento para micronutrientes:

Aplicar **Stomawet** a uma taxa de 25 - 75 ml / 100 ℓ de mistura de pulverização.

Como adjuvante para insecticidas e fungicidas:

Aplicar **Stomawet** a uma taxa de 25 - 100 ml / 100 ℓ de mistura de pulverização.

INSTRUÇÕES DE MISTURA:

Antes da aplicação de qualquer remédio agrícola, todo o equipamento de mistura e aplicação de pulverização deve ser cuidadosamente limpo. Ler cuidadosamente todas as instruções de limpeza nos rótulos dos remédios agrícolas.

Para evitar ou minimizar a formação de espuma, encher o tanque com água até um volume de ¾ ou ⅘. Se for antecipada a formação de espuma, deve ser acrescentado um agente antiespumante registado antes da adição de remédios agrícolas, nutrientes e **Stomawet**.

Adicionar remédios agrícolas e / ou fertilizantes como indicado no rótulo ou na sequência seguinte:

- Micronutrientes e fertilizantes;
- Fluidos secos e granulados dispersíveis em água (DF e WG);
- Suspensão Concentrada (SC);
- Pesticidas hidrossolúveis (SL e SP);
- Concentrados emulsionáveis (EC).

Continuar a agitação.

Adicionar **Stomawet** e misturar durante 1 - 2 minutos com agitação inferior ao normal.

Continuar a encher o tanque mantendo uma agitação mínima.

Para óptimos resultados, as misturas de pulverização contendo **Stomawet**, devem ser aplicadas trinta e seis (36) horas após a mistura.