



V-Plaask Zn

Concime CE
Soluzione di concime
a base di zinco (Zn) HGA

**CONSENTITO
IN AGRICOLTURA BIOLOGICA**
Materie prime:
Sale di Zinco complessato
con acido Eptagluconico



CONCIME CE **SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI ZINCO (Zn) HGA**

Materie prime: Sale di Zinco complessato con acido Eptagluconico

COMPOSIZIONE di V-Plaask Zn®:

Zinco (Zn) solubile in acqua 2,0%
Zinco (Zn) complessato con HGA 2%.
Agente Complessante: Acido Eptagluconico (HGA)
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità
della frazione complessata: 2-10

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H302: Nocivo per ingestione.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H410: Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P264: Lavare accuratamente mani e pelle
esposte dopo l'uso.
P273: Non disperdere nell'ambiente.
P280: Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338: IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciogliere accuratamente per parecchi
minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciogliere.

Fabbricante: **AGROSERV di Pugliese Emilia**
Via Garibaldi 89 - Tel: 01311740449

Partita n. vedi corpo della confezione



ATTENZIONE

Peso netto:
Kg 6,30 (pari a 1t 5)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Non disperdere il contenitore nell'ambiente
dopo l'uso. - Conservare il prodotto a temperatura compresa fra + 5 e + 35°C.
In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto, assorbire con materiali inerti e
smaltire secondo le norme locali.
Non superare le dosi appropriate.

CARATTERISTICHE: V-PLAASK Zn è un concime che per la sua particolare formulazione e in
grado di migliorare le caratteristiche qualitative dei vegetali.
V-PLAASK Zn utilizzato regolarmente, secondo le dosi e le modalità di impiego indicate, migliora
la conservabilità delle produzioni.



Dosi e modalità di impiego:

COLTURA	DOSE cc/ha	NOTE
AGRUMI	250 - 350 Massimo 3 lt/ha	Effettuare 3/4 applicazioni a partire da fine caduta petali con intervalli di 14/21 gg.
CARCIOFO E ORTAGGI A STELO	250-500 Massimo 3 lt/ha	Applicare a partire da 30 gg dall'emergenza e ripetere ogni 14 gg. per 3/4 interventi
CAVOLI	250-500 Massimo 3 lt/ha	Applicare prima dell'inizio della formazione della testa e ripetere ogni 7/14 gg.
CUCURBITACEE	300-400 Massimo 4 lt/ha	Applicare a fine fioritura e ripetere ogni 14 gg
DRUPACEE, POMACEE E FRUTTA A GUSCIO	200-300 Massimo 4 lt/ha	Applicare da fine fioritura con minimo 3/4 trattamenti ogni 7/14 gg.
ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE, BACCHE E PICCOLI FRUTTI	250 - 350 Massimo 3 lt/ha	Applicare settimanalmente a partire da 7/14 gg dal trapianto o dall'emergenza
ORTAGGI A TUBERO E RADICE Patata, sedano rapa, carote, ecc.	250 - 400 Massimo 4 lt/ha	Applicare prima della fioritura e ripetere ogni 7/14 gg.
SOLANACEE	250 - 500 Massimo 4 lt/ha	Applicare prima della fioritura e ripetere ogni 14 gg.
TABACCO, ORNAMENTALI, FLOREALI, ERBE AROMATICHE.	250 - 500 Massimo 4 lt/ha	Da una altezza di 30 cm della pianta, 2-3 interventi ogni 14 gg.
VITE	250 - 500 Massimo 4 lt/ha	Applicare a partire da gramolino differenziato ogni 14 gg

IMPORTANTE: AGITARE ED OMOGENEIZZARE PRIMA DELL'USO.

V-PLAASK Zn è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci e fertilizzanti
comunemente usati, ad eccezione di nutrienti fogliari ad alto contenuto di
fosforo.

V-PLAASK Zn viene somministrato per via fogliare ponendo particolare cura
nell'uniformità di distribuzione.

Temperatura ottimale d'impiego compresa fra 10°C e 30°C.

Prodotto originale: **NULANDIS** South Africa

5 Litri