



ZincMax®

CONCIME CE
MISCELA FLUIDA DI MICROELEMENTI
BORO (B) E ZINCO (Zn)

CONCIME CE

MISCELA FLUIDA DI MICROELEMENTI BORO (B) E ZINCO (Zn)

COMPOSIZIONE: Boro (B) solubile in acqua 0,5 %
Zinco (Zn) solubile in acqua 10 %

CARATTERISTICHE: **ZincMax** è un concime liquido per applicazioni fogliari particolarmente indicato per prevenire e curare le fisiopatie dovute alla carenza di zinco e boro. Lo zinco riveste un ruolo fondamentale in numerosi processi biologici quali la sintesi delle auxine, i processi di riproduzione cellulare, la biosintesi delle proteine, la resistenza delle colture alle basse temperature. L'impiego di **ZincMax** è indispensabile per sopperire alla scarsa mobilità dello zinco nel terreno e nei vegetali e per prevenire o curare sintomi derivanti dalla sua carenza. Inoltre il boro presente nello **ZincMax** svolge una funzione regolatrice e stimolatrice delle attività biologiche della pianta che presiedono alla fioritura, all'allegagione ed allo sviluppo dei frutti.

Dosi e modalità di impiego:

COLTURA	DOSE g/ha	NOTE
POMACEE Melo, Pero	50-100 massimo 3 kg/ha	Eseguire 3-4 applicazioni, 7 giorni dopo la fase di punte verdi, 14 giorni dopo la caduta dei petali e di nuovo dopo 14 giorni. Applicare un minimo di 1000 - 3000 l acqua/ha.
DRUPACEE Albicocco, Pesco, Susino, Ciliegio	75-150 massimo 1,5 kg/ha	Eseguire 2 applicazioni, una prima della fioritura e l'altra dopo la raccolta. Applicare un minimo di 1000 l acqua/ha.
CILIEGIO	50-100 massimo 1 kg/ha	Ripetere due volte a intervalli di 2-3 settimane. Applicare come trattamento a elevata quantità d'acqua subito dopo la fioritura. Applicare un minimo di 1000 l acqua/ha.
AGRUMI	50-150 massimo 3 kg/ha	Eseguire il trattamento sui nuovi germogli primaverili. Ripetere se necessario ma evitare il trattamento durante e prima del raccolto. Applicare un minimo di 2000 l acqua/ha.
CRUCIFERE, LATTUGA, POMODORI, PEPERONI, CUCURBITACEE, TABACCO	50-150 massimo 2 kg/ha	Eseguire 1-2 applicazioni. Potrebbero risultare necessarie applicazioni ripetute a seconda dell'entità della carenza di zinco. Applicare un minimo di 500 l acqua/ha. Effettuare un trattamento in post raccolta.
MAIS, FAGIOLI, PISELLI, SOIA, MAIS DOLCE	50-150 massimo 2 kg/ha	Eseguire 1-2 applicazioni. Per ottenere risultati migliori applicare all'inizio della stagione di crescita, non appena la coltura ha una quantità di foglie sufficiente per assorbire il trattamento. Applicare in un minimo di 200 l d'acqua/ha.
OLIVO	100 massimo 2 kg/ha	Eseguire il trattamento in primavera, alla ripresa vegetativa e ripetere dopo 3-4 settimane. Applicare un minimo di 1000 - 2000 l acqua/ha.
CIPOLLA	50-150 massimo 2 kg/ha	Applicare quando i bulbi hanno raggiunto la dimensione di una palla da golf e ripetere dopo 14 giorni. Applicare un minimo di 500 l acqua/ha.
FRUMENTO, ORZO, AVENA	50-150 massimo 2 kg/ha	Applicare all'inizio della stagione di crescita, non appena la coltura ha una quantità di foglie sufficiente per assorbire il trattamento. Ripetere dopo 3-4 settimane, se necessario. Applicare un minimo di 200 l d'acqua/ha.
PATATE	50-150 massimo 2 kg/ha	Applicare al manifestarsi dei primi sintomi di carenza e ripetere dopo 3-4 settimane, se necessario. Applicare un minimo di 500 l acqua/ha.

Eseguire ogni trattamento applicando 1000-2000 litri per ettaro di una soluzione ottenuta diluendo (o sciogliendo) in acqua il quantitativo di prodotto indicato.

IMPORTANTE: Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto, non superare le dosi appropriate. Non superare le dosi appropriate.

ZincMax è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci e nutrienti fogliari comunemente usati, ad eccezione di nutrienti fogliari ad alto contenuto di fosforo.

Non miscelare **ZincMax** con prodotti altamente alcalini come Miscela Solfocalcica o Pottiglia Bordolese. Qualora venissero impiegati sistemi di irrigazione a pioggia, evitare di programmare l'irrigazione direttamente dopo l'applicazione.

AVVERTENZE: Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso; Conservare il prodotto a temperatura compresa fra 0 e + 35°C; In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto, assorbire con materiali inerti e smaltire secondo le norme locali; In caso di coinvolgimento del prodotto in un incendio utilizzare acqua in abbondanza.

Prodotto originale: NULANDIS

Fabbricato da: **AGROSEV di Pugliese Emilia** Via Garibaldi 89-15026 Oviglio (AL)

**CONSENTITO
IN AGRICOLTURA BIOLOGICA**

Materie prime utilizzate:
Acido Borico e Ossido di Zinco

Peso netto: