



good chemistry

ZINC MAX



Nº do registo: DSV -213

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

Um complexo de zinco líquido para utilização como nutriente foliar em várias culturas para evitar ou corrigir deficiências de zinco.

GRUPO 2 FERTILIZANTE

COMPOSIÇÃO:

Zinco (Zn) 10.0 %m/m (13.0 %m/v)
Boro (B) 0.5 %m/m (0.65 %m/v)

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Volume líquido:

Agente:

AECI® Moçambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
T +258 84/82 274 7440

Fabricante:

AECI Plant Health uma divisão da AECI® Ltd
c/o Detinator & Chemical Crescent
Industrial Site, Modderfontein,
África do Sul
T +27 (11) 823 8000

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

UN No. 3082 ENVIRONMENTALLY HAZ-
ARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.



**PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.**

P8450 MOZ06/23 V3

Tóxico para os organismos aquáticos.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO

- ZINCMAX é compatível com a maioria dos pesticidas e alimentação foliar frequentemente utilizados, à exceção de alimentação foliar com um alto teor fosfórico.
- Não misturar ZINCMAX com matéria alcalina como sejam a Calda Sulfocálcica e a Calda Bordalesa.
- Quando se utilizam sistemas de irrigação por aspersão, deve evitar-se a irrigação programada logo a seguir à aplicação. Em pomares equipados com sistemas de micro irrigação, os depósitos da pulverização não devem ser afectados pela irrigação.
- Utilizar a concentração mais baixa para manutenção e a concentração mais alta para absorção suficiente.

TABELA DE APLICAÇÃO:

CULTURA	DOSAGEM/ha OU COMO INDICADO	MÉTODO DE APLICAÇÃO
MAÇÃS, PERAS	50 - 100 ml/100 ℓ de água até um máximo de 1ℓ/ha	Aplicar 3 - 4 pulverizações, 7 dias após os rebentos, 14 dias após a queda das pétalas e 14 dias mais tarde. Aplicar num mínimo de 1 000 - 3 000 ℓ de água/ha.
DAMASCOS, PÊSSEGOS, AMEIXAS, NECTARINAS	75 - 150 ml/100 ℓ de água até um máximo de 1,5 ℓ/ha	Aplicar 2 pulverizações, uma antes da floração e outra após a colheita. Aplicar num mínimo de 1 000 ℓ de água/ha.
PERA ABACATE, MACADÂMIAS	75 - 150 ml/100 ℓ de água até um máximo de 7,5 ℓ/ha	Aplicar 2-3 pulverizações. O número de aplicações será determinado pela gravidade da deficiência. Aplicar como um tratamento de início de Primavera às flores. Em casos mais graves, aplicar nos novos rebentos durante os meses de Verão. Utilizar 4000 - 5000 ℓ de volume de pulverização por hectare.
CEREJAS	50 - 100 ml/100 ℓ de água até um máximo de 1 ℓ/ha	Pulverizar duas vezes em intervalos de 2-3 semanas. Aplicar como pulverização de cobertura total logo que possível após o florescimento. Aplicar num mínimo de 1 000 ℓ de água/ha.
CITRINOS	50 - 150 ml/100 ℓ de água até um máximo de 3 ℓ/ha	Pulverizar durante o crescimento de novos rebentos na Primavera. Repetir quando necessário, evitando contudo a pulverização antes e durante a colheita. Aplicar num mínimo de 2 000 ℓ de água/ha.
CAFÉ	50 - 150 ml/100 ℓ de água até um máximo de 2 ℓ / ha	Aplicar 2-3 pulverizações dependendo da intensidade da deficiência. A primeira aplicação deve ser feita durante o mês de Novembro no crescimento de rebentos na Primavera e a segunda em Janeiro/ Fevereiro, seguido de uma terceira aplicação 21 dias mais tarde, se necessário.

NOTA: O VOLUME DE PULVERIZAÇÃO E DOSAGEM SERÃO DETERMINADOS PELA PRÓPRIA PLANTA OU SEU TAMANHO. A DOSAGEM ESTÁ DEPENDENTE DA INTENSIDADE DA DEFICIÊNCIA.

IMPORTANTE: ANTES DE PROCEDER À APLICAÇÃO DE ZINCMAX, CONSULTE UM AGRÓNOMO QUALIFICADO OU UM ASSESSOR AGRÍCOLA SOBRE A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.