



*good chemistry*

# ZINNIT



ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

Nº do registo: DSV-956

## SOLUÇÃO DE NITRATO DE ZINCO

Uma formulação líquida que contém ácido fúlvico para aumentar a biomassa do dossel.

### COMPOSIÇÃO:

Zinco (Zn) ..... 120 g/kg (158g/ℓ)

Nitrogénio (N) ..... 51 g/kg (67 g/ℓ)

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Volume líquido:

### Agente:

AECI Moçambique, Limitada  
Rua da Imprensa, Número 312,  
19º andar - Esquerda  
Cidade de Maputo, Moçambique  
T +258 84/82 274 7440

### Fabricante:

AECI® Limited  
14 Field Road,  
Boksburg  
Republica da África do Sul  
T +27 (11) 823 8000

UN No. 3264 - Corrosive liquid, acidic inorganic

PXXXX MOZ11/22 V1

Não Perigoso

**PARA MAIS INFORMAÇÕES,  
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.**

## **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO**

### **COMPATIBILIDADE:**

Para melhorar a eficácia do tratamento, utilizar um acidificante-molhante-penetrante adequado como o BLADBUFF 5\* (consultar o rótulo BLADBUFF 5). Misturar bem o BLADBUFF 5 com a água antes de adicionar o ZINNIT.

### **RECOMENDAÇÕES:**

#### **1. Pomares de frutas subtropicais (noz-pecã, abacate, citrinos e outros).**

Aplicar como tratamento de primavera na folhagem jovem (spring flush). Em casos acentuados de deficiência, podem ser necessários tratamentos sucessivos durante os meses de Verão.

Utilizar 50 - 75ml de ZINNIT em 100 l água com um volume de pulverização de 4.000 - 5.000 l água/ha. (2 - 3,75 l ZINNIT/ha). Aplicar como pulverização de cobertura e utilizar uma taxa mais elevada quando ocorrerem deficiências graves.

#### **2. Culturas arvenses e hortícolas (milho doce, milho, cereais (grão pequeno), feijão, cebola e outros).**

Aplicar durante as primeiras fases de crescimento em folhas jovens. Em condições que favoreçam as deficiências de zinco, são aconselháveis aplicações sucessivas.

Utilizar 250 - 500 l água/ha e não exceder 1 l de ZINNIT/ha por tratamento.

#### **3. Fertirrigação (tomates, alface e outros).**

Quando os sistemas de irrigação são utilizados para fins de fertilização, aplicar ZINNIT a uma taxa de 50 - 75ml / 100 l água, com um máximo de 1 l de ZINNIT/ha por tratamento. Aplicar ZINNIT durante a parte inicial do ciclo de irrigação. Podem ser necessárias aplicações repetidas.

**BLADBUFF 5:** (Contém agentes molhantes dispersantes, ácido, indicador de pH).